

Состав

действующее вещество: крушины кора (Frangulae cortex).

1 фильтр-пакет содержит крушины коры (Frangulae cortex) - 2,5 г.

Лекарственная форма

Кора.

Основные физико-химические свойства: измельченное сырье: кусочки коры различной формы. Цвет коры с внешней стороны - серовато-коричневый или темно-коричневый, с внутренней - оранжево-коричневый, красновато-коричневый или темно-красный.

Фармакотерапевтическая группа

Контактные слабительные средства. Код АТХ А06АВ.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества препарата оказывают мягкое слабительное действие, механизм которого заключается в усилении перистальтики толстой кишки, а не раздражая слизистую оболочку и не влияя на тонкий кишечник. Послабляющее действие наступает через 8-12 часов после приема.

Показания

Атония кишечника, привычные запоры.

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. Запоры неврогенного и эндокринного происхождения, спастические запоры, кишечная непроходимость, кровотечения, синдром «острого» живота, аппендицит, острый гастроэнтероколит, другие воспалительные процессы в брюшной полости, острые лихорадочные состояния.

Особые меры безопасности. Длительное применение препарата приводит к привыканию и ослаблению или отсутствию слабительного эффекта. Чтобы избежать привыкания, целесообразно чередовать с другими слабительными средствами.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано.

Способ применения и дозы

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 100 мл кипятка, закрыть и настаивать 15-20 мин. Применять в теплом виде по 100 мл на ночь, детям старше 12 лет - по $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{3}$ стакана (50-60 мл) на ночь.

Приготовленную водную вытяжку хранить при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Применение препарата рекомендуется детям от 12 лет.

Передозировка

При передозировке возможны коликообразная боль в животе, тенезмы, ощущение дискомфорта. При появлении указанных симптомов следует прекратить прием препарата. Лечение - симптоматическое.

Побочные реакции

При длительном применении могут развиваться диарея с метаболическими нарушениями, дегидратация, снижение функции ферментов кишечника, атония толстого кишечника, коликообразная боль, аллергические реакции.

Срок годности

5 лет.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 2,5 г в фильтр-пакетах; по 20 фильтр-пакетов в упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Лектравы».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.