

Состав

действующее вещество: девясила корневища и корни;

1 пачка содержит заблуждение корневищ и корней (Inulae rhizomata et radices) 100 г.

Лекарственная форма

Корневища и корни.

Основные физико-химические свойства: кусочки корней и корневищ различной формы. Цвет серовато-бурый, желтовато-белый, желтовато-серый.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства. Код АТХ R05C A.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества препарата оказывают отхаркивающее, противовоспалительное, антимикробное, желчегонное, мочегонное, тонизирующее действия; нормализуют моторную и секреторную функции различных отделов желудочно-кишечного тракта, улучшают обмен веществ.

Показания

Заболевания дыхательных путей (бронхиты, трахеиты, острые респираторные заболевания, пневмонии) заболевания желудочно-кишечного тракта (гастриты, энтероколиты, отсутствие аппетита, расстройства пищеварения).

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.
Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, почек.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не рекомендуется одновременное применение с противокашлевыми лекарственными средствами (в т.ч. лекарственными средствами, содержащими

кодеин, декстрометорфан).

В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

В период беременности и кормления грудью противопоказано применение препарата.

Способ применения и дозы

1 столовую ложку корневищ и корней поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 30 минут. Охладить при комнатной температуре 10 минут, процедить, остаток отжать в процеженный отвар. Объем отвара довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде 2-3 раза в день за 1 час до еды: взрослым и детям старше 14 лет - по $\frac{1}{2}$ стакана, детям 12-14 лет - по $\frac{1}{3}$ стакана, 7-12 лет - по 2 столовые ложки 3-7 лет - по 1 столовой ложке. Перед приемом отвар взболтать.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Препарат применять детям в возрасте от 3 лет.

Передозировка

Передозировка и длительное применение вызывают воспаление слизистых оболочек пищеварительного тракта, мочевыводящих путей, головная боль.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, отек), изжога, боль в животе. При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Лектравы».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.