

Состав

действующее вещество: тысячелистника трава (Millefolii herba);

1 пачка содержит тысячелистника травы (Millefolii herba) 50 г.

Лекарственная форма

Трава.

Основные физико-химические свойства: кусочки листьев, стеблей, корзинок и их части различной формы; серовато-зеленого цвета с белыми, коричневыми, фиолетовыми и желтыми вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа

Гемостатические средства растительного происхождения. Код АТХ В02В Х.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества травы усиливают свертываемость крови, оказывают противовоспалительное, бактерицидное, противоаллергическое действие, проявляют спазмолитический эффект по гладким мышцам кишечника, мочевыводящих и желчевыводящих путей.

Показания

Легочные, кишечные, геморроидальные, носовые, маточные (при воспалительных процессах, фибромиомах) кровотечения, гипоацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенные спастические колиты, метеоризм, заболевания печени и желчевыводящих путей (гепатиты, холециститы, ангиохолиты), заболевания почек и мочевого пузыря (цистит, уретрит, гломерулонефриты, пиелонефрит) - в составе комплексной терапии.

Противопоказания

Повышенная свертываемость крови, склонность к тромбообразованию.
Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата или к другим растениям семейства астровых (Сложноцветные).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна. В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не установлена.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано (повышает тонус матки).

Способ применения и дозы

1,5 столовые ложки травы поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настоять на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл.

Принимать в теплом виде 2-3 раза в день за 30 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет - по $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ стакана, детям 12-14 лет - по $\frac{1}{4}$ стакана.

Приготовленный настой хранить при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Препарат применять детям старше 12 лет по назначению врача.

Передозировка

Возможны аллергические реакции (гиперемия, сыпь), головокружение, тошнота.

Побочные реакции

Аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд и отек кожи). При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Лектравы».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.