

Состав

действующие вещества: 1 г сбора содержит прицепы травы (*Bidentis herba*) 0,1 г ромашки цветков (*Matricariae flores*) 0,1 г солодки корней (*Glycyrrhizae radices*) 0,2 г шалфея листья (*Salviae folia*) 0,2 г эвкалипта прутовидного листьев (*Eucalypti viminalis folia*) 0,2 г календулы цветков (*Calendulae flores*) 0,2 г.

Лекарственная форма

Сбор.

Основные физико-химические свойства: смесь кусочков разной формы серо-зеленого цвета с оранжево-желтыми, белыми и коричневыми вкраплениями; запах ароматный.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТХ D08A X.

Фармакодинамика

Компоненты препарата оказывают антимикробное действие в отношении стафилококка, кишечной и синегнойной палочек, вульгарного протей, пушистого микроспорума и других микроорганизмов; проявляют противовоспалительные свойства и стимулируют репаративные процессы.

Показания

В комплексной терапии острых и хронических заболеваний уха, горла и носа, воспалительных заболеваний ротовой полости и пищеварительного тракта.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Артериальная гипертензия; нарушение функции печени или почек; гипокалиемия, тяжелая степень ожирения.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Одновременное применение с сердечными гликозидами, антиаритмическими препаратами (хинидин), тиазидными и петлевыми диуретиками,

адренокортикостероидами и слабительными средствами может усилить гипокалиемию.

Особенности применения

С осторожностью применять больным миокардитом, перикардитом, инфарктом миокарда, брадикардией.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

По назначению врача, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способ применения и дозы

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Принимать в теплом виде 3 раза в день за 30 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет - по 1 стакану, детям 3-7 лет - по ¼ стакана, 7-12 лет - по ½ стакана, 12-14 лет - по ⅔ стакана. Местно настой применять для полосканий, примочек, микроклизм, орошений и ингаляций.

Приготовленный настой хранить при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально для каждого пациента.

Дети

Препарат применять детям в возрасте от 3 лет.

Передозировка

Длительное применение (более 2 месяцев) может привести к нарушению водно-электролитного баланса.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции (в т.ч. кожная сыпь, зуд, гиперемия кожи, образование отеков), повышение артериального давления, гипокалиемия. При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 1,5 г в фильтр-пакетах, по 20 фильтр-пакетов в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Лектравы».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.