

Состав

действующие вещества: черники побеги;

1 пачка содержит черники побегов - 75 г.

Лекарственная форма

Побеги.

Основные физико-химические свойства:

измельченное сырье: кусочки стеблей, листьев, изредка бутоны, цветки и плоды. Стебли - зеленые; листья молодежи от светло-зеленого до зеленого цвета, старые листья темные; венчик - зеленовато-белый с розовым оттенком плоды - черные ягоды с сизоватым поволокой.

Фармакотерапевтическая группа

Противодиабетические препараты. Код АТХ А10 Х.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества препарата проявляют гипогликемическое действие при сахарном диабете II типа легкой и средней тяжести, дает возможность в ряде случаев снизить суточные дозы пероральных противодиабетических средств; а также обладают противовоспалительным, мочегонным, желчегонным, вяжущим действием.

Показания

Легкие формы сахарного диабета.

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата; дискинезия желчевыводящих путей.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Безопасность и клиническая эффективность препарата в период беременности и кормления грудью не изучалась.

Способ применения и дозы

1 столовую ложку побегов поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настоять на кипящей водяной бане 15 минут. Охладить при комнатной температуре 45 минут, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Взрослым принимать настой в теплом виде по $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ стакана 3 раза в день за 15-20 минут до еды. Детям в возрасте от 3 лет, по рекомендации врача, в зависимости от возраста, от 1 десертной ложки до $\frac{1}{4}$ стакана 3 раза в день за 15-20 минут до еды. Перед употреблением настой рекомендуется взболтать.

Приготовленный настой хранить в холодильнике (при температуре 2-8 °C) не более 2 суток.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Препарат не назначать детям младше 3 лет.

Передозировка

Сообщений о передозировке препарата не поступало.

Побочные реакции

При индивидуальной гиперчувствительности к биологически активным веществам препарата возможны аллергические реакции (гиперемия, сыпь, зуд и отеки кожи). *При появлении побочных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.*

Срок годности

3 года. Не применять после истечения срока годности.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 75 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО Лектравы.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, д. 21.