

Состав

действующее вещество: мяты перечной листьев (Menthae piperitae folia);

1 пачка содержит мяты перечной листья (Menthae piperitae folia) 50 г.

Лекарственная форма

Листьев.

Основные физико-химические свойства: кусочки листьев различной формы с примесью кусочков стеблей от светло-зеленого до темно-зеленого или коричневатого-зеленого цвета, иногда с коричневато-фиолетовыми вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа

Противорвотные средства и препараты, устраняющие тошноту. Код АТХ А04А D.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества препарата оказывают желчегонное, седативное и слабое гипотензивное действие; повышают секрецию пищеварительных желез, возбуждают аппетит, подавляют процессы гниения и брожения в пищеварительном канале, снижают тонус гладких мышц кишечника, желче- и мочевыводящих путей, усиливают выделение желчи.

Показания

Заболевания пищеварительного тракта (тошнота различного происхождения, кишечные колики, метеоризм, спазмы пищеварительного тракта); заболевания печени (холецистит, гепатит, холангит, желчекаменная болезнь), как легкий успокаивающее средство (в составе комплексной терапии).

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.
Спазмофилия, круп, бронхиальная астма.

Особые меры безопасности. Пациентам с желудочно-пищеводного рефлюкса (изжогой) следует избегать применения листьев мяты перечной, поскольку может усиливаться изжога.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

По назначению врача в том случае, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способ применения и дозы

1 столовую ложку листьев поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл.

Принимать в теплом виде 2-3 раза в день за 15 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет - по $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$ стакана, детям 12-14 лет - по $\frac{1}{4}$ стакана, 7-12 лет - по 2 столовые ложки, 3-7 лет - по 1 столовой ложке. Перед применением настой взболтать.

Приготовленный настой хранить при температуре 8-15 °C не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Препарат применять детям в возрасте от 3 лет.

Передозировка

Нерациональное применение препаратов мяты может привести к боли в области сердца. Терапия симптоматическая.

Побочные реакции

Аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи, крапивница, контактный дерматит). При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

2 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Лектравы».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.