

Состав

действующее вещество: лапчатки прямостоячей корневища.

Лекарственная форма

Корневища.

Основные физико-химические свойства: кусочки корневищ различной формы от темно-красного до коричневатого-желтого цвета с красновато-коричневыми и коричневыми включениями.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм. Код АТХ А16АХ.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества препарата оказывают вяжущее, бактерицидное, противовоспалительное и кровоостанавливающее действие, снижают проницаемость капилляров, сужают кровеносные сосуды.

Показания

Заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, диспепсия, энтерит, энтероколит); желудочные, кишечные и маточные (при воспалительных процессах) кровотечения. Наружно - при воспалительных заболеваниях ротовой полости и горла.

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. Запоры.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Интервал между приемом препарата и применением других лекарственных средств должен составлять не менее 1 часа.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не установлена.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказано.

Способ применения и дозы

1 столовую ложку измельченных корневищ поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане в течение 30 мин, процедить, остаток отжать в процеженного отвара. Объем отвара довести кипяченой водой до 200 мл. Применять в теплом виде за 30-40 мин до еды: взрослым - по 1 столовой ложке 3-5 раз в сутки. Курс лечения - 2-4 недели.

Внешне применять взрослым и детям в виде полосканий.

Дети

Препарат применять детям только наружно - при воспалительных заболеваниях ротовой полости и горла.

Передозировка

Возможна боль в желудке, при возникновении которого необходимо отменить препарат.

Побочные реакции

Возможно развитие реакций гиперчувствительности. Возможно раздражение слизистой оболочки. При приеме внутрь возможны боли в желудке, тошнота, рвота. При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

4 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С.

Упаковка

По 50 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Лектравы».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, д. 21.