

Состав

действующие вещества: натрия кромогликат;

1 мл капель глазных содержит натрия кромогликата 40 мг;

вспомогательные вещества: глицерин, трилон Б, спирт поливиниловый, бензалкония хлорид, вода для инъекций.

Лекарственная форма

Капли глазные.

Основные физико-химические свойства: прозрачный, бесцветный или слегка желтоватый раствор.

Не содержит видимых частиц.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые в офтальмологии. Противоотечные и противоаллергические средства. Другие противоаллергические лекарственные средства. Код АТХ S01G X01.

Фармакодинамика

Натрия кромогликат угнетает дегрануляцию тучных клеток, стабилизируя клеточную мембрану, и таким образом предупреждает выделения гистамина и других веществ, вызывающих воспаление. Учитывая механизм действия препарата, наибольший эффект достигается, если капли применять также и с профилактической целью. Применение глазных капель Лекролин® уменьшает потребность в стероидах и антигистаминных средствах для лечения аллергического конъюнктивита. Этот препарат не предотвращает появление бактериального или вирусного конъюнктивита.

Фармакокинетика

Натрия кромогликат обратимо связывается с белками плазмы, примерно 65%.

Всасывания натрия кромогликата в глаза и кровь незначительно.

Биодоступность у людей после закапывания в глаза составляет 0,03%. Натрия кромогликат не метаболизируется, а выводится в неизмененном виде с желчью и мочой. После парентерального введения период полувыведения в плазме

составляет примерно 80 минут.

Показания

Острые и хронические аллергические конъюнктивиты.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к натрия кромогликату, бензалкония хлориду или другим компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При одновременном применении с другими местными офтальмологическими средствами следует выдерживать 15-минутный интервал между закапываниями.

Натрия кромогликат не имеет никаких нежелательных взаимодействий.

Особенности применения

Лекролин® содержит бензалкония хлорид как консервант, может вызвать раздражение глаз. Бензалкония хлорид может откладываться в мягких контактных линзах и обесцвечивать их. Перед закапыванием линзы следует снять и подождать не менее 15 минут перед тем, как надеть их снова. Как и при применении любых глазных капель, применение препарата Лекролин® может привести к мимолетного нарушения зрения.

При закапывании глазных капель следует избегать любого контакта наконечника капельницы с глазом или кожей.

В общем при аллергических конъюнктивитах ношение контактных линз не рекомендуется.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не влияет на способность управлять автотранспортом или работать с механизмами. Как и в других офтальмологических препаратах, сразу после применения возможно краткосрочное затуманивание зрения, поэтому, прежде чем начать управления автотранспортом или работе с механизмами, следует подождать восстановления четкости зрения.

Применение в период беременности или кормления грудью

Не выявлено побочных эффектов у плода при применении беременным. Однако применять средство в период беременности рекомендуется в случае, если ожидаемый эффект от терапии для матери превышает потенциальный риск для плода.

Натрия кромогликат может проникать в грудное молоко, но о нежелательное воздействие на ребенка при применении в рекомендуемых дозах не сообщалось.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 4-х лет по 1-2 капли в каждый глаз 2 раза в сутки.

При сезонном аллергическом конъюнктивите лечение следует начать сразу же после появления первых симптомов или для профилактики до начала периода опыления растений. Лечение следует продолжать в течение всего периода опыления, а в случае устойчивых проявлений аллергии - дольше.

Дети

Детям до 4-х лет препарат применять не рекомендуется.

Передозировка

В опытах на животных показано, что местная или системная токсичность натрия кромогликата очень низкая. При местном применении препарата симптомы передозировки маловероятны. В случае возникновения симптомов передозировки при необходимости применить симптоматическое лечение.

Побочные реакции

В случае местного применения натрия кромогликат хорошо переносится, редко сообщалось о симптомах раздражения.

Частые (> 1/100): преходящее чувство жжения, местное раздражение (включая ощущение инородного тела, хемоз, конъюнктивы гиперемия) временная нечеткость зрения.

Редкие (<1/10 000): реакции гиперчувствительности.

Возможны тяжелые генерализованные анафилактические реакции с бронхоспазмом, которые были связаны с введением натрия кромогликата.

Срок годности

3 года. Срок годности глазных капель после вскрытия флакона - 28 суток.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 5 мл в полиэтиленовом флаконе-капельнице; по 1 флакону в картонной коробке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Сантен АО.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Нииттихаанкату 20 33720 Тампере, Финляндия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).