

Показания к применению

- Гиполакримия (стабилизация слезной пленки).
- Синдром Сьюгрена (стабилизация слезной пленки, антиоксидантное действие).
- Эндокринная офтальмопатия (стабилизация слезной пленки, антиоксидантное действие, гипогликемическое действие, нейромедиаторное действие).
- Климактерический синдром (стабилизация слезной пленки, иммунокорректирующий эффект).
- Нейропаралитический кератит (антиоксидантное действие, гипогликемическое действие, нейромедиаторное действие).
- Синдром сухого глаза и его профилактика (стабилизация слезной пленки).
- Травмы глаза (антибактериальное действие, стабилизация слезной пленки, антиоксидантное действие, нейромедиаторное действие, противоотечное, обезболивающее действие).
- Дистрофические изменения роговицы (стабилизация слезной пленки, антиоксидантное действие, противоотечное действие, активизация обмена аминокислот).
- Дегенеративные изменения роговицы (стабилизация слезной пленки, антиоксидантное действие, стабилизация обмена белков, иммунокорректирующий эффект).
- Катаракта (антиметаболическое действие, антиоксидантное действие, стабилизация обмена белков).
- Аномалии рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм (стабилизация слезной пленки, антиоксидантное действие, активизация обмена аминокислот).
- До и после проведения кераторефракционных операций: фоторефракционной кератотомии, ЛАСИК и т.д. (стабилизация слезной пленки, антиоксидантное действие, противоотечное действие, активизация обмена аминокислот).
- Оперативные вмешательства на переднем сегменте глаза (стабилизация слезной пленки, антиоксидантное действие, противоотечное действие, активизация обмена аминокислот, нейромедиаторное действие, обезболивающее действие).

Противопоказания

Гиперчувствительность к любым компонентам продукта или другим химически родственными веществами.

Особенности применения

- Раствор является стерильным до открытия флакона.
- Чтобы предотвратить загрязнение раствора, плотно закрывайте флакон после использования и не прикасайтесь кончиком дозатора к глазу или к другим предметам.
- Если медицинское изделие в виде офтальмологического раствора используется для лечения, следует обратиться к врачу.
- Не используйте в случае глазной инфекции.
- Не используйте Лакрисек Плюс с другими офтальмологическими средствами. Перед закапыванием второй капли раствора подождите 10 минут.
- Не используйте раствор, если флакон поврежден.
- Продукт предназначен только для наружного применения в офтальмологии. Не используйте с контактными линзами.

Способ применения

Закапывать по 1 или 2 капли в конъюнктивальный мешок 4 раза в день или по указанию врача.

Побочные реакции

После закапывания может наблюдаться временная нечеткость зрения. Рекомендуются подождать несколько секунд, прежде чем начинать любую деятельность, требующую четкости зрения. В случае любой нежелательной реакции следует прекратить использование раствора и проконсультироваться с врачом.

Срок годности

2 года.

Не использовать через 30 дней после открытия флакона. Не использовать после истечения срока годности.

Условия хранения

Хранить при температуре от 4 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Не замораживать.

Упаковка

По 8 мл во флаконе в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Bioos Italia Srl (Италия).