

Состав

действующее вещество: гипромеллоза;

1 мл раствора содержит: гипромеллозы 3,2 мг;

вспомогательные вещества: цетримид; трилон Б; натрия фосфат, додекагидрат; натрия дигидрофосфат, дигидрат; сорбит (Е 420) вода для инъекций.

Лекарственная форма

Капли глазные, раствор.

Основные физико-химические свойства: бесцветный стерильный прозрачный раствор.

Фармакотерапевтическая группа

Искусственные заменители слезной жидкости и другие индифферентные препараты. Код АТХ S01X A20.

Фармакодинамика

Гипромеллоза - это частично метилированная и гидроксипропилированная целлюлоза.

В норме роговица должна быть увлажнена главным образом муцином, продуцируемый конъюнктивой. Муцин адсорбируется на роговице и формирует гидрофильную поверхность. При синдроме сухого глаза, особенно в случае дефицита муцина, следует назначать применение искусственной слезной жидкости.

Гипромеллоза особенно подходит для такого применения благодаря поверхностной активности и адсорбционной способности. Благодаря физико-химическому воздействию гипромеллоза в водном растворе снижает поверхностное натяжение, а также повышает вязкость. Гипромеллоза хорошо фиксируется на роговице и конъюнктиве и обеспечивает нормальное увлажнение. Симптомы раздражения, вызванные миганием, вызванным дефицитом слезной жидкости, таким образом уменьшаются, что предотвращает возникновение симптомов высыхания эпителия.

Показания

Для симптоматического лечения явлений пересыхания роговицы и слизистой оболочки глаза (синдром сухого глаза), вызванных нарушением слезной секреции и слезовидильной функции вследствие локальных или системных заболеваний, а также в случае недостаточного или неполного смыкания век. Для смачивания и дополнительного увлажнения твердых контактных линз.

Противопоказания

Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна.

Следует обратить внимание:

При применении других местных офтальмологических средств АРТЕЛАК® всегда должно быть последним препаратом для введения с интервалом примерно 15 минут, таким образом его пребывания на поверхности глаза, то есть увлажняющий эффект, не сокращается.

Особенности применения

Перед применением следует тщательно вымыть руки, при закапывании нельзя касаться глаза или век кончиком капельницы. Флакон после использования следует немедленно закрыть.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Даже при применении по назначению этот препарат может вызвать кратковременную нечеткость зрения через формирование полосы в поле зрения, поэтому при управлении автотранспортом или другими механизмами пациентам следует подождать, пока зрение прояснится.

Применение в период беременности или кормления грудью

Не существует риска, связанного с применением препарата АРТЕЛАК® в период беременности и кормления грудью, так как гипромеллоза не всасывается и таким образом не оказывает системного действия.

Способ применения и дозы

Лечение синдрома сухого глаза требует индивидуального дозирования. Если не предназначено другое, то, в зависимости от необходимости, следует закапывать в конъюнктивальный мешок по 1 капле от 3-х до 5-ти или более раз в сутки, наклонив голову назад, указательным пальцем одной руки оттянуть нижнее веко глаза вниз. Другой рукой, держа бутылочку с дозатором над глазом вертикально (не затрагивая глаза), капнуть одну каплю на оттянутый конъюнктивальный мешок. Пытаться потрогать глазным яблоком, не смыкая глаз, чтобы жидкость хорошо распространилась по нему.

Лица, которые носят мягкие контактные линзы, должны снять их перед применением препарата АРТЕЛАК® и подождать в течение 15 минут перед тем, как одеть их снова.

АРТЕЛАК® можно применять для повторного увлажнения твердых контактных линз.

В случае длительного применения препарата АРТЕЛАК® следует обратиться за консультацией к врачу.

Дети

Данные по применению препарата у детей отсутствуют.

Передозировка

Неизвестна и не требует никаких необходимых мер.

Побочные реакции

За основу данных о частоте возможных побочных эффектов взяты следующие категории:

- Очень часто ($\geq 1/10$)
- Часто (от $\geq 1/100$ до $<1/10$)
- Иногда (от $\geq 1/1000$ до $<1/100$)
- Редко (от $\geq 1/10\ 000$ до $<1/1000$)
- Очень редко ($<1/10000$)
- Неизвестно (на основе существующих данных частота побочных эффектов не может быть оценена).

Реакции повышенной чувствительности очень редки. Могут возникать жжение, покраснение, ощущение инородного тела в глазу, затуманивание зрения, слезотечение, отек, зуд, боль в глазу.

Сообщалось об очень редких случаях кальцификации роговицы при лечении фосфатосодержащих глазными каплями у пациентов с выраженными нарушениями роговицы.

Артелак® содержит цетримид как консервант, который может вызвать раздражение глаза, особенно при частом и длительном применении и может повредить роговицу глаза. Таким образом, для длительного лечения хронического сухого кератоконъюнктивит следует отдавать предпочтение лекарственным средствам без консервантов.

Срок годности

3 года.

После вскрытия флакона использовать не более 6 недель.

Препарат не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 30 ° С.

Упаковка

По 10 мл во флаконе с капельницей, по 1 флакону с капельницей в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Др. Герхард Манн, Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ, Германия/Dr. Gerhard Mann, Chem.-pharm. Fabric GmbH, Germany.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Брунсбюттелер Дамм 165-173, 13581 Берлин, Германия/ Brunsbutteler Damm 165-173, 13581 Berlin, Germany

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).