

Состав

Гипромеллоза 5 мг на 1 мл (Hypromellose), декспантенол (dexpanthenol), натрия хлорид (natrii chloridum), трилон Б (dinatrii edetas), вода для инъекций (aqua pro injectionibus).

Описание

УНИТИРС без консервантов - это жидкие глазные капли содержащие гипромеллозу и декспантенол. Они обладают защитным действием, восстанавливают эпителий и увлажняют глаза.

Гипромеллоза формирует временную защитную пленку на поверхности роговицы глаза, увлажняет поверхность глаза и служит заменителем слезы, устраняет ощущение "сухих глаз".

УНИТИРС без консервантов также облегчают небольшое раздражение глаз неинфекционного происхождения. Декспантенол (группы витамина В) помогает восстановить клетки на поверхности роговицы (способствует эпителиализации).

УНИТИРС без консервантов, идеальный для пользователей контактных линз и для людей с чувствительными глазами.

Показания

- При синдроме «сухого глаза» (сухом кератоконъюнктивите);
- при повреждении и эрозии роговицы;
- при попадании небольших инородных тел в конъюнктивальный мешок;
- после хирургических операций на глазу;
- при ощущении дискомфорта (жжение, зуд, ощущение инородного предмета), эти симптомы могут быть связанные с внешними факторами (например, кондиционирование воздуха, ветер, загрязнение окружающей среды, курение, пыль);
- при повышенном слезотечении (от длительной работы за компьютером) и при проблемах со зрением в течение дня;
- при ношении контактных линз;
- могут использоваться взрослыми, подростками и детьми.

Противопоказания

- При аллергии на любое вещество, входящее в состав этого препарата;
- при острой фазе воспаления глаза;

- при одновременном применении глазных лекарств, которые содержат соли металлов.

В случае применения других глазных лекарств посоветуйтесь с офтальмологом относительно совместного применения.

Способ применения и дозы

Рекомендуемая доза: одна капля в каждый глаз 2-3 раза в день.

Однако, в случае необходимости, может применяться 1 капля каждый час.

УНИТИРС можно использовать при ношении контактных линз.

Перед первым применением рекомендуется перед закапыванием глаз осторожно сжать флакон-капельницу, так как при сильном и неравномерном сжатии флакона может вылиться раствор в большем объеме. Дайте воздуху попасть обратно в пластмассовый флакон для дальнейшего закапывания так, чтобы флакон приобрел свою первоначальную форму, а затем продолжить применение капель в глаза как рекомендуется.

1. Вынуть пластмассовую бутылочку с OSD капельницы с бумажного упаковки.
2. Перед первым применением удалить защитную ленту с OSD капельницы.
3. Снять защитную крышку с OSD капельницы.
4. Закиньте голову назад, переверните пластиковую бутылочку, осторожно оттяните нижнее веко указательным пальцем, закапайте предназначенное количество капель медленно закройте глаза, так чтобы УНИТИРС без консервантов, равномерно распределились вдоль поверхности глаза.

Кончик капельницы не должен касаться глаз или век во время применения препарата. И наконец после закапывания препарата в глаза, необходимо надежно надеть защитный колпачок на капельницу бутылочки для предотвращения возможного загрязнения капельницы.

Побочные реакции

Изредка, сразу после применения вы можете почувствовать легкое жжение, которое проходит, или аллергическую реакцию на некоторые из веществ этого препарата, или ресницы могут временно склеиться друг с другом.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте в оригинальной упаковке.

Не хранить в холодильнике. Не замораживать.

Не используйте лекарства после окончания срока годности, указанного на бутылке, картонной коробке.

Упаковка

По 10 мл в флаконе; по 1 флакону в картонной упаковке.

Производитель

УНИМЕД ФАРМА ООО, Словакия