

Состав

действующее вещество: decamethoxine;

1 мл декаметоксину в пересчете на 100% вещество 0,2 мг;

вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода очищенная.

Лекарственная форма

Капли глазные.

Основные физико-химические свойства: бесцветная прозрачная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Противомикробные средства, применяемые в офтальмологии. Код АТХ S01A X.

Фармакодинамика

Препарат оказывает антисептическое действие и имеет широкий спектр антимикробного действия в отношении грамположительных (стафилококки, пневмококки, стрептококки) и грамотрицательных (гонококки, менингококки) кокков, коринебактерий, грамотрицательных бактерий (энтеробактерии, псевдомонады), простейших, дерматофитов, дрожжеподобных грибов рода *Candida*, хламидий и вирусов. В процессе применения Офтальмодек резистентные варианты микроорганизмов формируются медленно. Препарат потенцирует действие традиционных антимикробных средств при комплексном лечении.

Фармакокинетика

Не исследована.

Показания

Острый и хронический конъюнктивит, блефароконъюнктивит, гонобленорея, хламидиозного поражения слизистой оболочки глаза; для профилактики бленнореи у новорожденных, назначают в предоперационный период и после офтальмологических операций для профилактики гнойно-воспалительных осложнений. Для обработки контактных линз.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к декаметоксину или другим компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не исследована.

Особенности применения

В случае индивидуальной гиперчувствительности не следует применять препарат.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Пациентам, у которых наблюдается нечеткость зрения после закапывания препарата, следует воздерживаться от управления автотранспортом или работы с механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применение препарата в период беременности и кормления грудью возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Для лечения острого и хронического конъюнктивитов, блефароконъюнктивит, гонобленнореи, хламидийного поражения конъюнктивы Офталмодек закапывать в конъюнктивальный мешок по 2-3 капли 4-6 раз в день до полного выздоровления.

Для профилактики бленнореи у новорожденных в глаза закапывают по 2 капли препарата непосредственно после рождения и через 2 часа после родов.

С профилактической целью Офталмодек назначать по 2-3 капли 4-6 раз в сутки за 1 сутки до операционного вмешательства и в течение 3-5 дней после операции.

Контактные линзы погрузить в раствор препарата на 10-15 минут, после чего сполоснуть в стерильном 0,9% растворе натрия хлорида.

Дети

Препарат применять новорожденным для профилактики бленнореи.

Передозировка

Случаев передозировки не отмечалось.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции, местное раздражение глаза при повышенной индивидуальной чувствительности к декаметоксину.

Срок годности

3 года.

Срок хранения раствора после вскрытия флакона 14 суток.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 5 мл во флаконе с крышкой-капельницей в пачке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

1. Общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод «ГНЦЛС».
2. Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЭКС ГРУПП».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

1. Украина, Харьковская обл., город Харьков, улица Воробьева, дом 8.
2. Украина, 08300, Киевская обл., г. Борисполь, ул. Шевченко, д. 100.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).