

Состав

действующее вещество: фенольный гидрофобный препарат прополиса;

1 суппозиторий содержит фенольного гидрофобного препарата прополиса (в пересчете на 50 % содержание суммы фенольных соединений) 0,1 г (100 мг);

вспомогательные вещества: диметилсульфоксид, пропиленгликоль, твердый жир.

Лекарственная форма

Суппозитории.

Основные физико-химические свойства: суппозитории от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, пулеобразной формы, со специфическим запахом. Допускается наличие налета и неоднородность окрашивания в виде вкраплений и мраморности.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения.
Код АТХ C05A X.

Фармакодинамика

Фенольный гидрофобный препарат прополиса обеспечивает противовоспалительное, репаративное и антимикробное действие. Присутствие димексида в составе суппозитория дополняет спектр активности препарата обезболивающими свойствами, повышает резорбцию фармакологических веществ через слизистую оболочку.

Пропиленгликоль и основа создают условия для реализации терапевтических эффектов действующих веществ суппозитория.

Фармакокинетика

Нет данных.

Показания

Проктиты, анальные трещины, послеоперационные раны дистального отдела прямой кишки.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, аллергические реакции на продукты пчеловодства.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Можно применять в комбинации с другими препаратами, предназначенными для лечения сопутствующих заболеваний. Не рекомендовано одновременное применение с другими продуктами пчеловодства.

Особенности применения

Перед применением суппозитория необходимо:

- по линии перфорации блистерной упаковки оторвать один суппозиторий в первичной упаковке;
- далее необходимо потянуть за края пленки, разрывая ее в разные стороны, и освободить суппозиторий от первичной упаковки.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Каких-либо данных о влиянии препарата на способность управлять автомобилем или работать с другими механизмами нет.

Применение в период беременности или кормления грудью

В период беременности или кормления грудью применение препарата возможно по назначению врача в случае, если ожидаемая польза для женщины превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 7 лет – по 1 суппозиторию 3 раза в сутки после опорожнения кишечника. Продолжительность лечения определяет врач в зависимости от тяжести заболевания. Курс лечения может составлять от 8-10 дней до 14-21 дня.

Дети

Препарат не применяется для лечения детей младше 7 лет.

Передозировка

Не установлена.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 5 суппозиториев в блистере, по 1 или 2 блистера в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Частное акционерное общество «Лекхим-Харьков».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 61115, Харьковская обл., город Харьков, улица Северина Потоцкого, дом 36.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).