

Состав

действующие вещества: 1 суппозиторий содержит:

- бензокаина 100 мг;
- экстракта соцветий ромашки густого (*Matricariae extractum spissum*) (3:1) - 50 мг, (экстрагент вода очищенная);
- экстракта корней красавки густого (*Belladonnae radices extractum spissum*) (4:1) - 20 мг, (экстрагент спирт этиловый 70%);
- экстракта сложного густого (4:1), полученного по прописи (1:1:1:1) с:
 - травы раббарника (*Cytisi scorarii herba*) - 20 мг;
 - коры каштана конского (*Hippocastani corticis*) - 20 мг;
 - корневища лапчатки прямостоячей (*Tormentillae rhizomae*) - 20 мг;
 - травы тысячелистника (*Millefolii herbae*) - 20 мг, (экстрагент спирт этиловый 40%);

вспомогательные вещества: глицерин, твердый жир.

Лекарственная форма

Суппозитории.

Основные физико-химические свойства: суппозитории торпедообразные, коричневого цвета, со своеобразным запахом, с допустимым более светлым эллипсоидным концом и белым налетом на поверхности суппозитория.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения. Местноанестезирующие средства. Код АТХ C05A D.

Фармакодинамика

Гемороль - комплексный препарат, терапевтическое действие которого обусловлено фармакологическими свойствами активных компонентов, входящих в его состав. Препарат оказывает противоотечное, противовоспалительное действие, улучшает венозное кровообращение и снижает проницаемость капиллярных сосудов слизистой оболочки анального отверстия. Кроме того, оказывает спазмолитическое и местное обезболивающее действие.

Бензокаин оказывает противоаллергическое и местнообезболивающее действие.

Густой экстракт соцветий ромашки, экстракт из корневища лапчатки и экстракт травы тысячелистника оказывают противовоспалительное и вяжущее действие.

Густой экстракт коры каштана конского, в составе которого содержится эскулин с небольшим количеством эсцина, повышает эластичность вен.

Густой экстракт из корней красавки оказывает спазмолитическое действие на гладкие мышцы.

Показания

Геморрой, хронический проктит, трещины заднего прохода.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, другим амидных анестетиков, к растениям семейства сложноцветных (Asteraeae).

Онкологические заболевания прямой кишки и анального отверстия.

Гранулоцитопения, повышенная свертываемость крови, тромбоэмболическая болезнь.

Глаукома.

Тяжелая почечная недостаточность.

Заболевания сердечно-сосудистой системы, при которых увеличение частоты сердечных сокращений нежелательно: мерцательная аритмия, тахикардия, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, митральный стеноз, тяжелая артериальная гипертензия.

Задержка мочи или предрасположенность к ней.

Миастения.

Заболевания пищеварительного тракта, сопровождающихся непроходимостью.

Гипертермический синдром.

Тиреотоксикоз.

Острое кровотечение.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При применении с ингибиторами МАО возникают аритмии сердца, с хинидином, новокаиномидом - наблюдается суммирование холинолитического эффекта. Препарат может уменьшать продолжительность и глубину действия наркотических средств, ослабляет анальгезирующее действие опиатов.

При одновременном применении с димедролом или дипразином действие препарата усиливается; с нитратами, галоперидолом, ГКС для системного применения - возрастает вероятность повышения внутриглазного давления; с сертралином - усиливается депрессивный эффект обоих препаратов; со спиронолактоном, миноксидил - снижается эффект спиронолактона и миноксидила; с пенициллинами - усиливается эффект обоих препаратов; с низатином - усиливается действие низатида; кетоконазол - уменьшается всасывание кетоконазола; с аскорбиновой кислотой и аттапульгит - снижается действие атропина; с пилокарпином - снижается эффект пилокарпина при лечении глаукомы; с окспренолоном - снижается антигипертензивный эффект препарата. Под действием октадин возможно уменьшение гипосекреторный действия атропина, который ослабляет действие М-холиномиметиков и антихолинэстеразных средств. При одновременном применении с сульфаниламидными препаратами возрастает риск поражения почек с препаратами, содержащими калий - возможно образование язв кишечника; с нестероидными противовоспалительными средствами - риск образования язв желудка и кровотечений.

Действие препарата может усиливаться при одновременном применении других препаратов с антимускариновым эффектом М-холиноблокаторов, противопаркинсонических препаратов (амантадин), спазмолитиков, некоторых антигистаминных средств, препаратов группы бутирофенона, фенотиазин, диспирамидов, хинидина и трициклических антидепрессантов, неселективных ингибиторов обратного захвата моноаминов.

Угнетение перистальтики под действием атропина может привести к изменению всасывания других лекарственных средств.

Препарат может усилить действие антитромботических средств. Антибиотики цефалоспоринового ряда повышают концентрацию свободного эсцина в крови и риск развития побочных эффектов. Следует избегать одновременного применения с аминогликозидными антибиотиками в связи с усилением токсического действия аминогликозидов на почки.

Особенности применения

При наличии больших геморроидальных узлов после введения суппозитория может появиться боль через надавливания суппозитория в геморроидальный узел, боль может продолжаться в течение 5 - 10 мин до растворения суппозитория.

При применении препарата следует контролировать функцию почек.

С осторожностью применять пациентам с гипертрофией предстательной железы без обструкции мочевыводящих путей, с болезнью Дауна, при церебральном параличе, пациентам с печеночной и почечной недостаточностью, при рефлюкс-эзофагит; при грыже пищеводного отверстия диафрагмы, сочетающаяся с рефлюкс-эзофагитом, воспалительными заболеваниями кишечника, включая неспецифический язвенный колит и болезнь Крона, мегаколон; пациентам с ксеростомией, больным пожилого возраста ослабленным больным, при хронических заболеваниях легких без обратимой обструкции, при хронических заболеваниях легких, сопровождающихся низким производством мокроты, трудно отделяется, особенно у ослабленных больных, при вегетативной (автономной) нейропатии, повреждениях мозга.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

В случае возникновения побочных эффектов со стороны нервной системы, органов зрения следует воздержаться от управления автотранспортом или работы с механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

При беременности препарат противопоказан из-за опасности возникновения abortивного действия (экстракт травы раkitника, Эсцин).

В период кормления грудью применять с учетом соотношения риск/польза.

Способ применения и дозы

Применяют ректально.

Взрослым по 1 свече на ночь, в более тяжелых случаях - по 2-3 суппозитория в течение дня.

Лечение должно продолжаться до исчезновения болевых симптомов, но не более 7 дней.

Дети

Опыт применения препарата у детей отсутствует, поэтому его применяют этой возрастной категории пациентов.

Передозировка

Симптомы: усиление проявлений побочных реакций, тошнота, рвота, возбуждение, раздражительность, тремор, судороги, бессонница, сонливость, галлюцинации, гипертермия, угнетение центральной нервной системы, подавление активности дыхательного и сосудодвигательного центров.

Лечение: промывание желудка, парентеральное введение холиномиметиков и антихолинэстеразных средств. Симптоматическая терапия.

Побочные реакции

При применении препарата возможны изменения в месте введения, включая зуд в области применения, сыпь, гиперемия кожи.

Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая ангионевротический отек, анафилактические реакции, анафилактический шок.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожная сыпь, зуд, гиперемия, крапивница, отек кожи, ощущение жара, эксфолиативный дерматит.

Со стороны пищеварительного тракта: сухость во рту, жажда, нарушение вкусовых ощущений, дисфагия, снижение моторики кишечника до атонии, запор, снижение тонуса желчевыводящих путей и желчного пузыря.

Со стороны органов зрения: расширение зрачков, фотофобия, паралич аккомодации, повышение внутриглазного давления, временные расстройства зрения.

Со стороны дыхательной системы: уменьшение секреторной активности и тонуса бронхов, что приводит к образованию вязкой мокроты, тяжело откашливается.

Со стороны нервной системы: психомоторное возбуждение, судороги, головная боль, головокружение.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: сердцебиение, тахикардия, аритмия, включая экстрасистолию; ишемия миокарда артериальная гипотензия, покраснение лица, приливы.

Со стороны мочевыделительной системы: затруднение и задержка мочеиспускания.

Другие: уменьшение потоотделения, сухость кожи, дизартрия.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 6 суппозиторияев в блистере, по 2 блистера в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Вроцлавское Предприятие Лекарственных Май «Гербаполь» АО.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Ул. Гетманская 1, 59-220 Легница, Польша.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).