

Состав

действующие вещества: бензокаин, висмута субгаллат, цинка оксид, ментол;

1 суппозиторий содержит бензокаина (0,1 г) 100 мг, висмута субгаллата (0,04 г) 40 мг, цинка оксида (0,02 г) 20 мг, ментола (0,004 г) 4 мг;

вспомогательные вещества: полиэтиленоксид 1500, полиэтиленоксид 400.

Лекарственная форма

Суппозитории.

Основные физико-химические свойства: суппозитории зеленовато-желтого цвета, пулеобразной формы.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения. Местноанестезирующие средства. Код АТХ C05A D.

Фармакодинамика

Анестезол® – комплексное лекарственное средство, терапевтическое действие которого обусловлено фармакологическими свойствами активных компонентов, входящих в его состав. Анестезол® оказывает местноанестезирующее, противовоспалительное и вяжущее действие.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания

Симптоматическая терапия геморроя и трещин заднего прохода.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Повышенная чувствительность к другим амидным анестетикам.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не изучалось.

Особенности применения

При длительном применении препарата необходим контроль показателей крови.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

При лечении препаратом рекомендуется воздерживаться от управления транспортными средствами и выполнения работ, требующих повышенного внимания и точной координации.

Применение в период беременности или кормления грудью

Женщинам в период беременности или кормления грудью препарат назначает врач, учитывая соотношение риск/польза.

Способ применения и дозы

Перед применением суппозитория необходимо:

1. по линии перфорации блистерной упаковки оторвать один суппозиторий в первичной упаковке;
2. далее необходимо потянуть за края пленки, разрывая ее в разные стороны, и освободить суппозиторий от первичной упаковки.

Препарат применяют ректально. По 1 суппозиторию 1–2 раза в сутки после очистительной клизмы кишечника или самостоятельной дефекации.

Продолжительность лечения определяет врач, учитывая течение и тяжесть заболевания, достигнутый терапевтический эффект.

Дети

Данных о применении препарата детям нет.

Передозировка

При применении в терапевтических дозах передозировка маловероятна. Возможно усиление проявлений побочных реакций. Лечение симптоматическое.

Побочные реакции

Иногда возникают аллергические реакции, кожная сыпь, зуд. Препарат может оказывать слабительное действие, вызывать жжение в заднем проходе. При длительном применении могут развиваться реакции со стороны крови (метгемоглобинемия).

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 5 суппозитория в блистере, по 1 блистеру в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Частное акционерное общество «Лекхим-Харьков».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 61115, Харьковская обл., город Харьков, улица Северина Потоцкого, дом 36.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).