

Состав

действующее вещество: ихтиол;

1 суппозиторий содержит ихтиола 200 мг

вспомогательные вещества: твердый жир.

Лекарственная форма

Суппозитории ректальные.

Основные физико-химические свойства: суппозитории темно-бурого цвета с запахом ихтиола. Допускается появление едва заметного белого налета на поверхности суппозитория.

Фармакотерапевтическая группа

Антигеморроидальные средства для местного применения. Код АТХ C05A X.

Фармакодинамика

Ихтиол содержит примерно 10,5% серы в виде органических соединений, чем обусловлены его антисептические, противовоспалительные и обезболивающие свойства. Противовоспалительное действие связано с угнетением высвобождения медиаторов воспаления. При ректальном применении препарат оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку прямой кишки, из-за чего рефлекторно усиливается кровообращение в органах малого таза, что способствует устранению воспаления в предстательной железе у мужчин; в яичниках, маточных трубах, матке - у женщин.

Фармакокинетика

При ректальном введении хорошо всасывается в прямой кишке. Выводится с калом.

Показания

В комплексном лечении воспалительных заболеваний малого таза (метрит, параметрит, сальпингит, аднексит, оофорит), хронического неспецифического простатита и геморроя.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Взаимодействие препарата в виде суппозиторий с другими лекарственными средствами не описано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Данные отсутствуют.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат можно применять в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода (ребенка).

Способ применения и дозы

Назначать взрослым. Вводить ректально по 1 свече 1-2 раза в сутки после очистительной клизмы или после обычного акта дефекации. Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально. Обычно курс лечения составляет 7-14 дней. При рецидиве заболевания курс лечения повторить.

Дети

Не применять детям.

Передозировка

Случаи передозировки не описаны.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции, включая зуд, кожные высыпания, отек, покраснение в месте введения препарата.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 15 ° С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 5 суппозитория в стрипе. По 2 стрипа в пачке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ПАО «Монфарм».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 19100, Черкасская обл., Г.. Монастырище, ул. Заводская, 8.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).