

Состав

действующее вещество: концентрат масла облепихи;

1 суппозиторий содержит концентрата облепихового масла 0,3 г;

вспомогательные вещества: жир твердый.

Лекарственная форма

Суппозитории ректальные.

Основные физико-химические свойства: суппозитории от темно-оранжевого до оранжевого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболические процессы.
Код АТХ А16А Х.

Фармакодинамика

Препарат оказывает противовоспалительное, репаративное (ранозаживляющее) действие, обусловленное мембраностабилизирующими и антиоксидантными эффектами масла облепихового.

Фармакокинетика

При введении суппозитория в прямую кишку эффект препарата проявляется через 15-90 мин. Продолжительность резорбционной действия алкалоидов колеблется от 2 до 6 часов.

Показания

В проктологии - при хронических заболеваниях прямой кишки, геморрое, колитах.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата, диарея, воспалительные заболевания поджелудочной железы, желчнокаменная болезнь.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Взаимодействие с другими лекарственными средствами в настоящее время неизвестно.

Особенности применения

Перед началом лечения посоветуйтесь с врачом! Без консультации врача не применяйте препарат дольше установленного срока! Если признаки заболевания не начнут исчезать или же, наоборот, состояние здоровья ухудшится, или появятся нежелательные явления, обратитесь к врачу за консультацией относительно дальнейшего применения препарата.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применение в период беременности или кормления грудью возможно, если, по мнению врача, ожидаемый положительный эффект для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способ применения и дозы

Применять ректально после опорожнения кишечника, суппозиторий вводить глубоко в задний проход.

Взрослым и детям старше 12 лет - по 1 свече 1-3 раза в сутки в течение 7-10 суток.

Детям в возрасте от 6 до 12 лет - по 1 суппозиторию 1 раз в сутки в течение 7-10 суток.

Продолжительность лечения определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания.

Дети

Применять детям в возрасте от 6 лет.

Передозировка

Случаи передозировки не описаны.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции, ощущение жжения в области заднего прохода.

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 5 суппозиториев в стрипе. По 2 стрипа в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ПАО «Монфарм».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 19100, Черкасская обл., г. Монастырище, ул. Заводская, 8.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).