

Состав

действующие вещества: гепарин натрия, преднизолона ацетат, полидоканол;

1 г мази содержит гепарина натрия 65 МО, преднизолона ацетата 2,233 мг полидоканола 30 мг;

вспомогательные вещества: парафин, масло минеральное, ланолин, кремния диоксид коллоидный.

Лекарственная форма

Мазь ректальная.

Основные физико-химические свойства: желтовато-белого цвета полупрозрачная мазь, похожая на гель, с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения.
Код АТХ C05A X03.

Фармакодинамика

Проктозан НЕО обеспечивает эффективное лечение характерных симптомов и последствий геморроя. Препарат быстро устраняет воспаление в аноректальной области, а также сопутствующие ощущения, такие как зуд, жжение, покалывание, боль и ощущение влажности. Проктозан НЕО, благодаря чистому гепарину, предотвращает тромбообразование в геморроидальных сплетениях. Преднизолон оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие. Полидоканол оказывает местное обезболивающее действие и устраняет зуд.

Фармакокинетика

После местного применения гепарина в относительно низких концентрациях обнаруживается в кровотоке, не оказывает системного действия. В крови

связывается с белками плазмы (95%). Метаболизируется в печени (частично ферментом печеночная гепариназа) и в ретикулоэндотелиальной системе. Выводится почками. В моче обнаруживается от 20% до 50% препарата в неизмененном виде. Период полувыведения зависит от дозы (увеличивается с увеличением дозы).

Преднизолон содержится в препарате и всасывается в малых количествах, недостаточно для системного действия.

Полидоканол оказывает исключительно местное действие.

Показания

Для симптоматического лечения геморроя и зуда в перианальной области в течение короткого периода времени.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата инфекции в перианальной области; склонность к кровотечениям; специфические поражения кожи (например, сифилис); генитальный герпес другие вирусные инфекции; вторичные инфекции кожи при отсутствии соответствующей антибиотикотерапии.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Проктозан НЕО, мазь для ректального и местного применения не рекомендуется применять вместе с другими лекарственными средствами для ректального применения.

Особенности применения

Данные отсутствуют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Проктозан НЕО мазь не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат не следует применять в I триместре беременности. Рекомендуется осторожность при применении на поздних сроках беременности (II - III триместр).

В период кормления грудью препарат можно применять после консультации с врачом.

Способ применения и дозы

Проктозан НЕО, мазь для ректального и местного применения наносить на пораженные участки кожи 2 раза в сутки после дефекации. В первый день лечения для облегчения симптомов мазь можно применять 4 раза в сутки.

При внутреннем геморрое для глубокого введения мази на тубу надеть аппликатор, ввести его в прямую кишку и легким нажатием на нижнюю часть тубы выдавить небольшое количество мази.

Дети

Клинический опыт применения препарата у детей отсутствует.

Передозировка

При местном применении препарата, в системном кровообращении можно обнаружить в относительно низких концентрациях, не следует ожидать каких-либо токсических эффектов.

Побочные реакции

Обычно препарат переносится хорошо, только в редких случаях могут возникнуть реакции повышенной чувствительности и местного раздражения кожи (существует небольшая возможность аллергических реакций на полидоканол).

Длительное применение может привести к замедленному заживлению ран и трещин и системного действия преднизолона.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 20 г мази в тубе; по 1 тубе с аппликатором в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

«Хемофарм» АД/«Hemofarm» AD.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Белградский путь б / н, 26300, г.. Вршац, Сербия/Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Serbia.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).