

Состав

действующее вещество: polygonum hydropiper;

1 флакон содержит экстракта травы перца водяного (Herba Polygoni hydropiperis) жидкого (1: 1) (экстрагент - этанол 70%) - 25 мл.

Лекарственная форма

Экстракт жидкий.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость зеленовато-бурого цвета, ароматного запаха.

Во время хранения возможно выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Гемостатические средства растительного происхождения. Код АТХ В02В Х.

Фармакодинамика

Биофлавоноиды, содержащиеся в водяном перце (рутин, кверцетин, гиперозид, рамназин, кемпоферол, мирецетин, лютеолин), проявляют Р-витаминную активность, уменьшают проницаемость капилляров, нормализуют структуру сосудистой стенки, защищают от окисления аскорбиновую кислоту, содержащуюся в водяном перце. Вместе с аскорбиновой кислотой участвуют в окислительно-восстановительных реакциях, снижают активность гиалуронидазы. Кровоостанавливающее действие лекарственного средства сочетается со способностью стимулировать сокращение мышц матки подобно рожков, но это свойство значительно слабее.

Гликозид полигопиперин ускоряет свертываемость крови.

Дубильные вещества проявляют противовоспалительное и вяжущее действие. Вместе с биофлавоноидами оказывают синергический кровоостанавливающий эффект.

Максимальная фармакологическое действие биофлавоноидов перца водяного достигается за счет экстракции 70% этиловым спиртом. При такой концентрации в нем растворяются флавоноиды, находящиеся как в свободной (агликон), так и в связанной (с гликозидной частью) форме. Этим достигается максимальное всасывание основных действующих веществ, через микроворсинки желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) в кровь. Путем окислительно-восстановительных реакций, происходящих с участием флавоноидов, они подвергаются гидролизу, образуя агликон и гликозид. Первый выделяется почками с мочой и через кишечник с желчью, последний (углеводный остаток) или окисляется в цикле Кребса до двуокиси углерода и воды, или депонируется в виде гликогена в организме.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания

Как вспомогательное средство в акушерско-гинекологической практике при маточных послеродовых кровотечениях, при субинволюции матки, гиперменорагии. Применяют при кровотечениях из мелких сосудов желудка, кишечника, при несильных геморроидальных кровотечениях.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 12 лет.

Особые меры безопасности.

Не применять вместе с молочными продуктами для предотвращения образования комплексов (хелатных), не всасываются.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не выявлено.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Поскольку в составе препарата содержится этанол, не рекомендуется применять «Водяного перца экстракт жидкий» во время управления автомобилем и работе с потенциально опасными механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применять только тогда, когда ожидания польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

«Водяного перца экстракт жидкий» взрослым и детям старше 12 лет принимать по 30-40 капель 3-4 раза в сутки (за полчаса до еды). Курс лечения зависит от характера и тяжести заболевания, достигнутого эффекта, характера комплексной терапии.

Дети

Эффективность и безопасность применения препарата у детей в возрасте до 12 лет не установлены, поэтому препарат не рекомендуется применять этой возрастной категории пациентов.

Передозировка

В случае превышения дозы лечение симптоматическое.

Побочные реакции

Головная боль, тошнота, рвота, головокружение аллергические реакции, в том числе кожная сыпь, покраснение, зуд.

Срок годности

3,5 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 25 мл в флаконах.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «ФИТОФАРМ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 84500, Донецкая обл., г. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).