

Состав

действующее вещество: decamethoxine;

1 мл декаметоксину в пересчете на 100% вещество 0,5 мг;

вспомогательные вещества: этанол (70%).

Лекарственная форма

Капли ушные.

Основные физико-химические свойства: бесцветная прозрачная жидкость с запахом спирта.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для применения в отологии. Противомикробные средства. Код АТХ S02A A.

Фармакодинамика

Препарат обладает антисептическим действием и широким спектром антимикробного действия в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (гноеродных коки, в том числе стафилококки с множественной антибиотикоустойчивые, энтеробактерии, коринебактерии дифтерии), простейших, дрожжеподобных грибов рода *Candida*, дерматомицетов и вирусов. На микроорганизмы препарат действует бактерицидно, спороцидно, фунгицидно. Ауридексан повышает чувствительность бактерий к антибиотикам, потенцирует действие традиционных антимикробных средств при комплексном лечении.

Фармакокинетика

Не исследована.

Показания

Лечение бактериальных и грибковых острых и хронических внешних и средних неперфоративных отитов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к декаметоксину или этанола.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не исследована.

Особенности применения

В случае индивидуальной гиперчувствительности не следует применять препарат.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применение препарата в период беременности и кормления грудью возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

После вскрытия флакон закрыть крышкой-капельницей.

Взрослым и детям старше 12 лет в каждое ухо закапывать в теплом виде по 2-3 капли Ауридексана 3-4 раза в сутки. Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания и достигнутого эффекта и определяется врачом индивидуально.

Дети

Опыт применения декаметоксину детям до 12 лет отсутствует, поэтому препарат не следует назначать этой возрастной категории пациентов.

Передозировка

Случаев передозировки не отмечалось.

Побочные реакции

Возможно быстропреходящими ощущение жжения при применении препарата, а также реакция местного раздражения кожи уха (наружного слухового прохода, ушной раковины) при повышенной индивидуальной чувствительности к декаметоксину.

Срок годности

4 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 5 мл во флаконе с крышкой-капельницей в пачке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

1. Общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод «ГНЦЛС».
2. Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМЭКС ГРУПП».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

1. Украина, 61057, Харьковская обл., город Харьков, улица Воробьева, дом 8.
2. Украина, 08301, Киевская обл., г. Борисполь, ул. Шевченко, д. 100.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).