

Состав

10 г содержит: масло сосны обыкновенной - 685 мг, масло эвкалиптовое - 432.5 мг, α-токоферола ацетат - 288.5 мг, тимол - 21.75 мг, левоментол - 72.25 мг;

вспомогательные вещества: вазелин белый, воск белый, макрогола и глицеридов абрикосового масла эфиры (лабрафил М-1944-CS), бутилгидроксанизол.

Лекарственная форма

Мазь.

Мазь назальная белого цвета, прозрачная, с запахом эфирных масел.

Фармакотерапевтическая группа

Препарат с противомикробным и противовоспалительным действием для местного применения в ЛОР-практике.

Деконгестанты и другие препараты для местного применения. Код АТХ R01A.

Фармакодинамика

Противоконгестивное средство растительного происхождения. Обладает противовоспалительным и антисептическим действием.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания

- Острые и хронические воспалительные заболевания слизистых оболочек носа и носоглотки, сопровождающиеся высыханием слизистых оболочек носа;
- состояния после операций в полости носа и тампонады носа (в условиях стационара и амбулаторно).

Противопоказания

- Аллергический ринит;

- детский возраст до 2 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Лекарственное взаимодействие препарата Пиносол® не описано.

Особенности применения

Необходимо избегать попадания препарата на слизистую оболочку глаз.

При появлении нежелательных явлений или других необычных реакций, не описанных в инструкции, пациенту необходимо обратиться к врачу.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

При применении препарата способность к концентрации внимания не снижается.

Применение в период беременности или кормления грудью

Возможно применение мази назальной Пиносол® при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Способ применения и дозы

Режим дозирования

Взрослым и детям старше 2 лет препарат наносят в количестве приблизительно 0.5 см в каждый носовой ход на поверхность слизистой оболочки передних отделов носовой полости. Для введения можно использовать ватный тампон (палочку, обернутую в конце комочком ваты). Затем умеренным надавливанием на крылья носа растирают мазь по слизистой оболочке носа.

Процедуру повторяют 3-4 раза/сут. Длительность лечения составляет 7-14 дней. Увеличение продолжительности курса лечения возможно по рекомендации врача.

Дети

Препарат назначают детям старше 2 лет.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не наблюдалось.

Побочные реакции

Местные реакции: зуд, жжение, покраснение или отек слизистой оболочки носовой полости.

Прочие: аллергические реакции.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С.

Упаковка

Туба 10 г в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

АО «Санек Фармасьютикалз».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Нитрянська 100, 920 27 Глоговец, Словацкая Республика.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).