

Состав

действующее вещество: 1 таблетка содержит хлортианизеном 12 мг;

вспомогательные вещества: крахмал картофельный, тальк, сахар-рафинад, кальция стеарат.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрические, с фаской.

Фармакотерапевтическая группа

Антинеопластические средства. Код АТХ L01X.

Фармакодинамика

Хлортианизен - противоопухолевое средство, синтетический аналог эстрогенов.

Подавляет пролиферацию опухолевых клеток на всех стадиях рака предстательной железы. Снижает выработку половых гормонов. По сравнению с другими синтетическими эстрогенными препаратами действует продолжительнее.

При эстроген-резистентных формах опухолей малоэффективно.

Имеет минимальные феминизирующие свойства (способность вызывать появление у мужчин женских вторичных половых признаков - увеличение молочных желез, отложение жира на бедрах).

Повышает свертываемость крови, снижает концентрацию холестерина, повышает концентрацию триглицеридов в крови. Способствует переходу внутрисосудистой жидкости в внеклеточное пространство, что приводит к образованию отеков. Проявляет меньше центральных эффектов по сравнению с препаратами, содержащими эстрон, эстрадиол.

Фармакокинетика

Не исследовалась.

Показания

Рак предстательной железы. Рак молочной железы (только пациентам в поздней менопаузе и с удаленной маткой).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, острые и хронические заболевания печени, генитальные кровотечения неустановленного происхождения, тромбоэмболические нарушения в анамнезе.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Хлортрианизен при совместном применении снижает эффективность варфарина, инсулина, гормонов щитовидной железы, фенитоина, карбамазепина, фенобарбитала, рифампицина; повышает эффективность трициклических антидепрессантов.

Не следует применять одновременно с тамоксифеном.

Особенности применения

При раке молочной железы препарат назначать только пациентам в поздней менопаузе и с удаленной маткой (из-за возможности гиперплазии слизистой оболочки матки).

С осторожностью назначать больным сахарным диабетом, эпилепсией, а также с заболеваниями сердца и почек.

В начале лечения могут наблюдаться тошнота, отсутствие аппетита, рвота, диарея, набухание и боль в молочных железах, которые обычно проходят самостоятельно.

При приеме хлортрианизеном следует избегать длительного пребывания на солнце, поскольку препарат повышает чувствительность кожи к солнцу.

Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Данные отсутствуют.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат не применять в период беременности и кормления грудью.

При необходимости применения препарата следует прекратить кормление грудью.

Способ применения и дозы

Назначать взрослым внутрь во время еды.

Рак предстательной железы. Назначать по 1 таблетке (12 мг) 2-3 раза в сутки. При метастазах дополнительно назначать преднизолон.

Рак молочной железы. Назначать по 1 таблетке (12 мг) 4 раза в сутки; суточная доза - 4 таблетки (48 мг).

Максимальные дозы для взрослых: разовая - 1 таблетка (12 мг), суточная - 4 таблетки (48 мг).

Препарат предназначен для длительного применения. Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Информация по применению препарата детям отсутствует.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота.

Лечение: симптоматическое. Специфического антидота не существует.

Побочные реакции

Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, отсутствие аппетита, рвота, диарея.

Со стороны репродуктивной системы: набухание и боль в молочных железах, феминизация у мужчин, маточные кровотечения у женщин.

Со стороны сердечно-сосудистой системы и системы крови: проявления недостаточности кровообращения, тромбоэмболические осложнения, отеки,

артериальная гипертензия, повышение свертываемости и вязкости крови, повышенная кровоточивость.

Другие: аллергические реакции, нарушение минерального обмена.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 таблеток в блистере, по 10 блистеров в коробке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).