

Состав

Йодид калия, вспомогательные компоненты.

Описание

Основная биологическая роль йода состоит в поддержании функции щитовидной железы и построении ее гормонов - тироксина и трийодтиронина. На сегодняшний день йод является единственным известным микроэлементом, участвующим в образовании этих гормонов. Физиологическая роль гормонов щитовидной железы очень велика: контроль за интенсивностью основного обмена, влияние на водно-солевой, жировой и углеводный обмены.

Как гормон, тироксин находится в постоянной связи с другими железами внутренней секреции, особенно с гипофизом и половыми железами, регулирует деятельность мозга, нервной и сердечно-сосудистой систем, стимулирует рост и умственное развитие ребенка.

Исследования, проведенные в последние годы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в различных странах мира показали, что уровень умственного развития (IQ) напрямую связан с йодом. Гормональные нарушения, возникающие из-за дефицита йода, не имеют временно внешне выраженный характер, поэтому йододефицит получил название «скрытый голод». Больше всего от этого голода страдают дети: задерживается рост, замедляется психическое развитие, иногда даже развивается кретинизм, им все труднее учиться в школе, снижается процесс запоминания и освоения новых знаний и навыков.

Недостаток йода, как «строительного элемента» гормона щитовидной железы, часто является скрытой причиной развития многих заболеваний.

Показания

Одним из основных способов покрытия дефицита йода является также употребление в пищу йодсодержащих продуктов: молока, яиц, мяса, морской рыбы. Но, в большинстве случаев, содержание йода в таких продуктах точно не определено, а при длительном хранении и кулинарной обработке может теряться до 65% микроэлемента.

«Йод-Актив плюс®» - аналог природного соединения йода, применяется в комплексной терапии и для профилактики заболеваний щитовидной железы.

Противопоказания

Чувствительность к компонентам; лицам с заболеваниями щитовидной железы; лицам, которые принимают другие препараты йода; женщинам в период беременности и лактации.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 12 лет по 1 таблетке 2 раза в день во время еды, запивая водой. Курс приема - 1-2 месяца.

Срок годности

2 года.