

Состав

действующее вещество: экстракт из пантов марала, изюбря или из пантов пятнистого оленя (1: 6,58);

вспомогательные вещества: ароматизатор «Груша», этанол 52%.

Лекарственная форма

Экстракт жидкий, спиртовой.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость светло-желтого цвета. Допускается выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Тонизирующие средства. Код АТХ А13А.

Фармакодинамика

Натуральные биологически активные вещества (аминокислоты, нуклеотиды, витамины, минеральные вещества, фосфолипиды, жирные кислоты, стерины), которые входят в состав лекарственного средства, необходимые для построения собственных ферментов, гормонов, клеточных и тканевых структур, укрепление иммунной защиты.

Препарат стимулирует (тонизирует) нервную систему и мышцы, обмен веществ и основные физиологические процессы, способствует адаптации и устойчивости организма к неблагоприятным факторам окружающей среды, повышенных физических и умственных нагрузок, инфекционных заболеваний.

Фармакокинетика

Не исследовалась.

Показания

В составе комплексного лечения:

- переутомление, нервное истощение, неврозы, астенические состояния, вызванные инфекционными заболеваниями (грипп, туберкулез и т.д.), низкое артериальное давление;

- анемия и снижение иммунитета, заболевания органов дыхания, нарушения пищеварения и обмена веществ (ожирение);
- сексуальные расстройства у женщин (нарушение менструального цикла, снижение либидо) и мужчин (импотенция, вызванная облучением, сопутствующими заболеваниями и психоэмоциональными стрессами, преждевременной эякуляцией, слабостью половой активности у лиц пожилого возраста);
- для повышения работоспособности при выполнении тяжелых работ, пребывании в суровых климатических и неблагоприятных экологических условиях.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия, органические заболевания сердца, стенокардия, выраженный атеросклероз, повышенная свертываемость крови, тяжелые формы нефрита, диарея, злокачественные новообразования.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не следует назначать Пантокрин с препаратами кальция, лекарственными средствами, повышающие свертываемость крови (витамин К) и стимулируют сокращение гладких мышц кишечника (домперидон). Пантокрин усиливает действие пирацетама и других ноотропных препаратов.

Особенности применения

Это лекарственное средство содержит не менее 48% этанола (алкоголя), то есть 378,8-757,6 мг / доза (20-40 капель), что эквивалентно 9,6-19,2 мл пива, 4-8 мл вина.

Вреден для пациентов, больных алкоголизмом. Следует быть осторожным при применении детям и пациентам с заболеваниями печени и больным эпилепсией.

При длительном применении больших доз препарата необходимо контролировать артериальное давление, свертываемость крови и функцию почек.

При выраженной побочном действии применение пантокрин следует прекратить и решить вопрос об уменьшении дозы или отмене препарата.

При хранении лекарственного средства допускается выпадение осадка, поэтому перед приемом его необходимо взбалтывать.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат содержит этанол.

Влияние на способность управлять автотранспортом или работать с механизмами не известно.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат содержит этанол.

Опыт применения беременным и женщинам в период кормления грудью отсутствует.

Способ применения и дозы

Взрослым препарат применять внутрь по 20-40 капель, предварительно растворив их в небольшом количестве воды, за 30 минут до еды или через 2 часа после еды, 2-3 раза в сутки.

Детям от 7 лет препарат применять внутрь из расчета - 1 капля на каждый год жизни, предварительно растворив в небольшом количестве воды, за 30 минут до еды или через 2 часа после еды 2 раза в сутки.

Последний прием препарата - за 4 часа до сна.

Курс лечения составляет 3-4 недели. По назначению врача курс лечения можно повторить.

Дети

Препарат содержит этанол.

Препарат применять детям в возрасте от 7 лет.

Передозировка

При передозировке препарата могут отмечаться головная боль, покраснение кожи, нервное возбуждение, диарея.

Лечение симптоматическое.

Побочные реакции

При применении препарата редко могут наблюдаться головная боль, кожный зуд.

У лиц с повышенной чувствительностью к компонентам препарата возможны аллергические реакции.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 мл в стеклянных или полимерных флаконах с пробкой-капельницей.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «Тернофарм».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).