

## **Состав**

*Активное вещество:* фолиевая кислота - 600 мкг, Витамин В6 - 6 мг, Витамин В12 - 5 мкг, витамин Е - 36 мг, Витамин С - 300 мг.

*Вспомогательные вещества:* картофельный крахмал, сахар, стеарат кальция.

## **Описание**

Биологически активная добавка Доппельгерц Актив Фолиевая кислота и Витамины это жизненно необходимый и незаменимый витамин, в котором организм нуждается для поддержания многочисленных процессов обмена веществ.

## **Показания**

*Как стимулятор кроветворения:*

- при гиперхромных макроцитарных и мегалобластических анемиях, которые вызваны недостаточностью фолиевой кислоты;
- в терапии спру в качестве средства для купирования или уменьшения симптомов заболевания, нормализации эритропоэза;
- лейкопения и анемия, которые развились из-за действия ионизирующего излучения, химических (медикаментозных) веществ;
- анемии после операции резекции желудка или части кишечника;
- мегалобластные анемии из-за туберкулеза кишечника или гастроэнтерита (в т.ч. – для профилактики анемии при этих состояниях);
- пеллагра;
- пернициозная анемия.

*С профилактической целью:*

- превентивное лечение при беременности и вскармливании грудью.

## **Противопоказания**

Реакции аллергического характера на фолиевую кислоту.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

В комбинации с неомицином, хлорамфениколом, тетрациклинами и полимиксином наблюдается уменьшение абсорбции фолиевой кислоты в кишечнике. Фолиевая кислота может снижать эффективность ПАСК, примидона, гормональных пероральных контрацептивов, сульфосалазина, фенитоина, хлормфеникола за счет ускорения их метаболизма.

### **Способ применения и дозы**

Таблетки принимать внутрь после приема пищи.

*С лечебными целями* рекомендуется по 1-2 таблетки 1-3 р/сутки. Суточная доза составляет 5 таблеток.

*Детям* можно назначать фолиевую кислоту с 3 лет: по 0,25 мг (1/4 таблетки), максимально 2 таблетки/сутки.

Продолжительность приема фолиевой кислоты – от 20 до 30 суток.

*Беременным* рекомендуется назначать по 4 таблетки/сутки. При лактации – по 3 таблетки/сутки.

### **Передозировка**

Сообщений о передозировке фолиевой кислоты не поступало.

### **Побочные реакции**

Обычно фолиевая кислота переносится хорошо. Возможны реакции аллергического характера, которые купируются приемом противоаллергических средств, отменой препарата или снижением его дозы.

### **Условия хранения**

Храненить при температуре не выше 25°C, в сухом и недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 10 таблеток в блистере, по 3 блистера в упаковке.

### **Производитель**

Квайссер Фарма ГмбХ и Кою КГ, Германия.