

Состав

действующее вещество: натрия хлорид;

1 мл натрия хлорида 6,5 мг;

вспомогательные вещества: натрия дигидрофосфат, дигидрат; натрия фосфат, додекагидрат; бензалкония хлорид, вода для инъекций.

Лекарственная форма

Капли назальные. Спрей назальный.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при заболеваниях полости носа. Код АТХ R01A X10.

Фармакодинамика

Эффективно увлажняет слизистую оболочку носа, разжижает густую слизь, размягчает сухие чешуйки в носу и способствует их легкому удалению.

Высокоочищенный стабилизированный 0,65% раствор натрия хлорида максимально соответствует естественному назальному секрету. Буферные вещества, входящие в состав препарата, приближают рН раствора до рН природной секреторной жидкости слизистой оболочки носа и поддерживают этот показатель на постоянном уровне.

Но-Соль® увлажняющий улучшает обоняние и транспортную функцию мерцательного эпителия, способствует восстановлению носового дыхания, сокращает период реабилитации, позволяет уменьшить дозу и частоту использования сосудосуживающих средств местного действия.

Показания

Применять младенцам, детям и взрослым.

- Для гигиенического ухода за полостью носа, профилактики и комплексного лечения заболеваний слизистой оболочки носа и придаточных пазух, сопровождающихся сухостью слизистой оболочки носа или образованием слизи (атрофический, аллергический, инфекционный, медикаментозный

ринит).

- как вспомогательное средство при применении локальных сосудосуживающих средств.
- для устранения сухости слизистой оболочки носа, обусловленной работой кондиционеров, в том числе автомобильных, или радиаторов центрального отопления, при повторных перелетах.
- после операционных вмешательств в полости носа и носовых пазухах.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Данные о влиянии препарата на действие других лекарственных средств отсутствуют.

Можно применять с другими лекарственными средствами в составе комплексной терапии.

Особенности применения

Чтобы избежать распространения инфекции, рекомендуется индивидуальное использование флакона.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Без ограничений.

Способ применения и дозы

Непосредственно перед применением нужно подержать флакон с препаратом в ладони, чтобы согреть его до температуры тела.

Капли назальные

Взрослым - по 2 капли; детям в возрасте от 1 года - по 1-2 капли; детям до 1 года - по 1 капле в каждый носовой ход с лечебной целью 3-4 раза в сутки, с гигиенической целью - 1-4 раза в сутки.

Курс лечения составляет до 4 недель. При необходимости можно повторить курс лечения через месяц.

Взрослые

Перед началом процедуры следует вымыть руки с мылом и аккуратно освободить носовые ходы от секрета быстрым резким выдохом через нос. Для предотвращения утечки раствора необходимо лечь или сесть и запрокинуть голову назад, затем, стараясь не касаться капельницей флакона внутренних стенок носа, закапать препарат. После закапывания желательно побыть в положении лежа с запрокинутой назад головой в течение 2 минут. Остатки раствора удалить с лица ватой или носовым платком.

Дети

Перед началом процедуры следует вымыть руки с мылом и аккуратно освободить нос ребенка от слизи. После очистки носа от слизи закапать капли «Но-Соль® увлажняющий» в каждый носовой ход. При закапывании капель в правую ноздрю голова ребенка должна быть запрокинута немного назад и наклонена вправо и, наоборот, голова ребенка должна быть наклонена влево при закапывании капель в левую ноздрю. После закапывания следует посадить ребенка и помочь ей освободить нос от разрезанного слизи. Остатки раствора необходимо аккуратно удалить с лица ватой или носовым платком.

Дети

Детям применять под наблюдением взрослых.

Передозировка

Случаи передозировки, а также любые токсичные или системные реакции в результате применения препарата не описаны.

Побочные реакции

У лиц с индивидуальной непереносимостью компонентов препарата возможны аллергические реакции.

Срок годности

3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ° С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

Капли. По 10 мл во флаконе полиэтиленовом. По 1 флакону в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

АО «Фармак».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 04080, г.. Киев, ул. Кирилловская, 74.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).