

Состав

действующие вещества: 1 таблетка содержит высушенные лекарственные растения в виде порошка:

корня горечавки (*Radix Gentianae*) 6 мг,

цветков первоцвета с чашечкой (*Flores Primulae cum Calycibus*) 18 мг,

травы щавеля (*Herba Rumicis*) 18 мг,

цветков бузины (*Flores Sambuci*) 18 мг,

травы вербены (*Herba Verbenae*) 18 мг

вспомогательные вещества: кальция карбонат (E 170), масло касторовое, кремния диоксид коллоидный, акрилатный сополимер, желатин, глюкоза, лактоза, магния оксид, гидроксид алюминия, меди хлорофиллинов (E 141), рибофлавин (E 101), крахмал кукурузный, декстрин, воск горный гликолевый, крахмал картофельный, вода очищенная, шеллак, сорбит (E 420), кислота стеариновая, сахароза, тальк, титана диоксид (E 171), индиго (E 132).

Лекарственная форма

Таблетки, покрытые оболочкой.

Основные физико-химические свойства: круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые оболочкой зеленого цвета с гладкой поверхностью.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Код АТХ R05X.

Фармакодинамика

Компоненты, входящие в состав растительного лекарственного средства, имеют комплексную активность, которая проявляется в секретолитическом действии, противоотечный, противовоспалительный, иммуностимулирующий и противовирусный эффект.

Активные компоненты лекарственного средства Синупрет® подавляют размножение различных респираторных вирусов, таких как вирус гриппа А, парагриппа и РСВ (респираторно-синцитиальный вирус).

Во Препарат регулирует секрецию и уменьшается отек тканей.

Восстанавливается дренаж и вентиляция околоносовых пазух, устраняет заложенность носа, нормализуется защитная функция эпителия дыхательных путей. Повышается эффективность антибиотикотерапии.

Показания

Острые и хронические воспаления околоносовых пазух.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из действующих или вспомогательных компонентов препарата, к другим видам первоцвета, а также язва.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не наблюдалось. Комбинация с антибиотиками возможна и целесообразна.

Особенности применения

Рекомендована консультация врача, если у больного наблюдаются выраженные симптомы синусита тяжелой степени, такие как кровотечение из носа, лихорадка, сильная боль, гнойные выделения из носа, нарушения зрения, асимметрия средней части лица или глаз, онемение лица, поскольку в таком случае может быть нужна неотложная медикаментозная терапия.

Если симптомы заболевания сохраняются более 7-14 дней, усиливаются или периодически повторяются, следует обратиться к врачу.

Особого внимания требует применения лекарственного средства пациентам с гастритом или функциональной диспепсией (так называемый «чувствительный желудок»). Препарат следует применять после еды с достаточным количеством жидкости (например стаканом воды).

Препарат содержит глюкозу, лактозу, сахарозу и сорбит. Поэтому больным с наследственной непереносимостью фруктозы, галактозы, отсутствием лактазы, с нарушением всасывания глюкозы-галактозы или недостаточностью сахараз-изомальтазы препарат не следует принимать.

Примечание для больных сахарным диабетом. 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит в среднем 0,01 ХЕ.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Особых предостережений нет.

Применение в период беременности или кормления грудью

В период беременности и кормления грудью препарат следует применять с осторожностью и только после четкого установления врачом диагноза и оценки соотношения пользы для матери и риска для плода (ребенка).

Способ применения и дозы

Если врач не назначил другое, взрослым и детям старше 12 лет принимать по 2 таблетки 3 раза в сутки, детям в возрасте от 6 до 11 лет - по 1 таблетке 3 раза в сутки.

Таблетки следует глотать не разжевывая, с достаточным количеством жидкости.

Обычно рекомендованный курс лечения составляет 7-14 дней.

Следует придерживаться рекомендаций, изложенных в разделе инструкции «Особенности применения».

Дети

В связи с недостаточностью опыта не рекомендуется применять детям до 6 лет. Для лечения детей дошкольного возраста (до 6 лет), которым назначаются меньшие дозы, следует применять Синупрет в виде капель или сиропа.

Передозировка

Случаи передозировки в настоящее время неизвестны. При превышении дозы возможно усиление указанных побочных реакций - в таком случае следует обратиться к врачу.

При приеме доз, превышающих рекомендуемые, следует сообщить об этом врачу для принятия решения о необходимых мерах.

Побочные реакции

Нечасто наблюдаются желудочно-кишечные расстройства, включая боль в желудке, тошноту, диарею, рвоту, боль дискомфорт. Возможны реакции повышенной чувствительности, включая сыпь, покраснение кожи, зуд,

крапивница, отек Квинке, одышку, припухлость лица.

При любых проявлениях побочных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня указанного месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 ° C в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 таблеток в блистерах, помещенных в картонную коробку.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Бионорика СЕ.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Керхенштейнерштрассе, 11-15, 92318, г.. Ноймаркт, Германия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).