

Состав

Активные ингредиенты: глюкоза обезвоженная, цитрат натрия, натрия хлорид, калия хлорид.

вспомогательные вещества: ароматизатор клубники.

Свойства

Растворимый регидратант.

Первая линия при лечении острой диареи (согласно рекомендациям ВОЗ, UNICEF и ESPGHAN)

EASYSalt – эффективная профилактика обезвоживания:

- сбалансированный и адекватный состав;
- легкий и удобный в использовании;
- приятный вкус (клубничный вкус).

Удобная порционная форма приёма.

Можно растворить в 1 стакане кипяченой или бутылированной воды (прямо в бутылке).

Жидкая форма = быстрый эффект

Действует быстрее таблеток.

Своевременное начало регидратации позволит быстро остановить диарею и восстановить энергию, устранить другие симптомы обезвоживания и существенно улучшить самочувствие.

Пероральная регидратация – единственный способ компенсации утраченных электролитов и жидкости. Своевременная и адекватная регидратация поможет избежать развития осложнений.

Рекомендации к применению

- Острая диарея;
- рвота;
- повышенная температура;
- интенсивные физические нагрузки;
- обезвоживание;

- ожоги.

Европейская ассоциация гастроэнтерологов рекомендует обязательную оральную регидратацию как первую линию лечения острой диареи.

Меры предосторожности

Индивидуальная непереносимость к компонентам. Продукт не предназначен для употребления лицам с нарушением функции почек, алкалозом, нарушениями сознания и всасыванием углеводов. Если в течение 24 часов после начала использования состояние не улучшится, обратитесь к врачу. Обратите внимание, что маленькие дети особенно склонны к обезвоживанию! Продукт не предназначен для парентерального использования. При обезвоживании средней и тяжелой степени необходимо обратиться к врачу.

Способ применения и дозы

Содержимое 1 саше развести в 200 мл воды комнатной температуры.

Принимать взрослым по следующей схеме:

В первые 4-6 часов с момента возникновения первых симптомов (период первичной (активной) регидратации): по 50-100 мл/кг массы тела. Употреблять небольшими порциями в течение 4 часов.

Поддерживающая регидратация: развести 1 саше в 200 мл воды. Принимать по необходимости и/или после каждого приступа рвоты и/или диареи.

Не добавлять в сок, чай или молоко.

Рвота не является противопоказанием к применению и обычно проходит во время употребления.

Количество жидкости, которую следует употреблять, зависит от степени обезвоживания и массы тела.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Упаковка

10 саше в картонной коробке.

Производитель

ЧП "Евро-Плюс", Украина.