

Состав

1 капсула содержит: рыбий жир (18/12 EPA/DHA 30%) – 1000 мг (содержит не менее 300 мг омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, в состав которых входят этиловые эфиры эйкозапентаеновой кислоты (EPA) – не менее 18% , докозагексаеновой кислоты (DHA) – не менее 12%), масло ростков пшеницы – 100 мг;

вспомогательные вещества: желатин, глицерин (наполнитель), вода очищенная.

Описание

Препарат «Рейтоил» оказывает иммуностимулирующее, антигипертензивное, антиатеросклеротическое, противовоспалительное и противопсориатическое действие.

Особенности

Комплекс биологически активных веществ, входящий в состав диетической добавки «Рейтоил», способствует ускорению заживления ран, снижению вязкости крови и уменьшению риска тромбообразования; положительно влияет на умственную деятельность: улучшает обучаемость, повышает жизненный тонус и работоспособность; способствует повышению концентрации внимания у детей и улучшению памяти; помогает поддержанию здоровья матери и плода (предотвращает преждевременные роды, дефицит массы тела при рождении); обладает общеукрепляющими, гиполипидемическими и антиоксидантными свойствами.

Показания

«Рейтоил» рекомендован в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник омега-3 полиненасыщенных жирных кислот – эйкозапентаеновой кислоты (EPA), докозагексаеновой кислоты (DHA) и натурального витамина Е с целью общего укрепления организма и профилактики.

- нарушений липидного обмена (гипертриглицеридемии, дислипидемии), связанных с избыточной массой тела, сахарным диабетом, артериальной гипертензией и атеросклерозом;
- заболеваний сердечно-сосудистой системы (атеросклероз, тромбоз) и костно-суставного аппарата;

- язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;
- поражений кожи и слизистых.

Противопоказания

Не принимать при индивидуальной чувствительности к компонентам.

Особенности применения

Перед употреблением рекомендуется консультация врача.

Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

Диетическую добавку нельзя было использовать как замену полноценного рациона питания.

Не рекомендуется одновременный прием диетической добавки и других лекарственных средств, содержащих витамин Е.

Витамин А, аскорбиновая кислота, тиамин, рибофлавин, пиридоксин, препараты магния усиливают действие препарата.

Не рекомендуется применение диетической добавки в сочетании с фибратами (клофибрат, ципрофибрат, фенофибрат, этофибрат, гемфиброзил).

Применение в период беременности или кормления грудью

В период беременности и кормления грудью препарат следует принимать только по назначению врача.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям в возрасте от 3-х лет – по одной капсуле 2-3 раза в сутки во время или после еды. Не разжевывай, запроси водой (150-200 мл).

Курс употребления – не менее 3-х месяцев. Курс можно повторить (при необходимости).

Побочные реакции

Возможно проявление аллергических реакций.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 капсул в блистере; по 3 блистера в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

УОРЛД МЕДИЦИН ЕВРОПА, Румыния.