

Состав

1 таблетка содержит листья сенны экстракт 90 mg (мг) (с содержанием кальция сеннозидов А и В 15% - 13,5 mg (мг)).

вспомогательные вещества: стабилизатор крахмал кукурузный наполнитель целлюлоза микрокристаллическая глазирующий агент поливинилпирролидон (PVP K-30); антиспикаючи агенты тальк, магния стеарат консервант бензоат натрия (Е 211).

Показания

Сенадексин Ананта может быть рекомендовано как диетическая добавка к рациону питания, биологически активные вещества которой облегчают дефекацию при запорах и состояниях, требующих снижения плотности каловых масс. Сенадексин Ананта может быть применен для очистки кишечника перед диагностическими процедурами.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к компонентам, беременность и период кормления грудью, дети до 12 лет.

Не превышать указанную рекомендуемое количество (порцию) для ежедневного потребления. Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.

Способ применения и дозы

Прием Сенадексин Ананта рекомендуется детям от 12 лет и взрослым. Взрослые и подростки старше 12 лет рекомендуется принимать по 1 таблетке один раз в сутки. При необходимости дозу увеличивают до 2-3 таблеток в сутки или по рекомендации врача. Таблетку рекомендуется применять вечером перед сном, запивая водой и принимать внутрь независимо от приема пищи.

Срок употребления: 7-14 дней, или принимать по рекомендации врача. При необходимости курс Сенадексин Ананта можно повторять.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке производителя.

Упаковка

По 20 таблеток в блистере, по 25 блистеров в упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Ананта Медикаер Лимитед

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

621, Ринг Рoad Малл, Сектор 3, Рохини, Нью Дели - 110085, Индия