

Состав

действующие вещества: ментол, камфора, масло мяты перечной, масло эвкалиптовое, масло гвоздичное, масло коричное;

1 г бальзама содержит ментола 41 мг, камфоры 258 мг, масла мяты перечной 125 мг, масла эвкалиптового 88 мг, масла гвоздичного 9 мг, масла коричневого 14 мг

вспомогательные вещества: воск пчелиный, парафин, ланолин, парафин белый мягкий, метиловый оранжевый.

Лекарственная форма

Бальзам.

Основные физико-химические свойства: бальзам консистенции от светло-желтого до коричнево-желтого цвета с запахом эфирных масел.

Фармакотерапевтическая группа

Противозудными средствами. Код АТХ D04A X.

Фармакодинамика

Препарат относится к группе средств, стимулирующих рецепторы слизистых оболочек, кожи и подкожных тканей. Бальзам обладает противовоспалительными, местно согревающими, антисептическими, анестезирующими свойствами, также расширяет капилляры, улучшая кровоснабжение и незначительно снижая артериальное давление, действует на рефлекторные центры центральной нервной системы, проявляя стимулирующий эффект. Действие бальзама Звезда проявляется ослаблением воспалительного процесса и рефлекторным устранением ощущения боли (головной, мышечной), вызванного гриппом, простудными заболеваниями, болезнями органов опорно-двигательного аппарата, поражениями кожи и другими факторами.

Показания

Симптоматическое лечение головокружения, головной боли, простуды, насморка, тошноты; при укусах насекомых.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Бронхиальная астма, коклюш, псевдокруп, склонность к бронхоспазма или судом. Повреждения кожи, в том числе при ожогах, нарушении целостности кожи, экземе, дерматите, гнойничковых заболеваниях кожи.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Исследования по взаимодействию с другими лекарственными средствами не проводились.

Особенности применения

Только для наружного применения. Избегать контакта бальзама с глазами, слизистыми оболочками и открытыми ранами. НЕ втирать в ноздри. В редких случаях возможны аллергические реакции. В случае появления таких реакций следует прекратить применение лекарственного средства и смыть его остатки из мест нанесения теплой водой с мылом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

В случае возникновения побочных реакций со стороны нервной системы (головокружение, возбуждение, судороги) следует воздержаться от управления автотранспортом или работы с механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Из-за отсутствия опыта применения бальзама Звезда в период беременности и кормления грудью назначать этой категории пациентов не рекомендуется.

Способ применения и дозы

Нанести небольшое количество бальзама на отдельные участки и втирать в кожу: при головной боли - в область виска и затылка; при насморке - под ноздрями; при простудных заболеваниях - в область груди, спины, живота, при укусах насекомых - на место укуса.

Продолжительность лечения зависит от индивидуальных особенностей пациента, течения заболевания и определяется достигнутым терапевтическим эффектом, характером комплексной терапии и переносимостью препарата.

Дети

Противопоказан детям до 3 лет.

Препарат следует с осторожностью применять детям от 3 лет в области лица, поскольку может вызвать бронхоспазм.

Передозировка

Возможно усиление проявлений побочных реакций, чувство сильного тепла и жжение.

При случайном попадании внутрь возможны боли в животе, тошнота, рвота, диарея, симптомы угнетения центральной нервной системы, головокружение, атаксия, судороги, приливы, сонливость, затруднение дыхания.

Лечение смыть нанесенный препарат водой с мылом. Промывание желудка, симптоматическая терапия.

Побочные реакции

Аллергические реакции, включая сыпь, крапивницу, зуд, раздражение кожи и слизистых, покраснение, дерматит, включая контактный дерматит, особенно у детей.

Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, возбуждение; возможно возникновение судорог, вызванных камфарой.

Со стороны дыхательной системы: увеличивается вероятность и частота возникновения спазма бронхов, особенно у детей.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 4 г в баночке; по 1 баночке в картонной пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Данафа Фармасьютикал Джоинт Сток Компани.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Ул. Зунг Си Тхань Тхэ, б.253., г. Дананг, Вьетнам.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).