

Состав

1 таблетка содержит:

- Кора каперсов колючих 70 мг.
- Семена цикория дикого 70 мг.
- Железа оксид - 10 мг.
- Паслен черный - 42 мг.
- Кора терминалии арджуна - 32 мг.
- Кассия западная - 25 мг.
- Семена дерева обыкновенного - 26 мг.
- Тамарикс гальский - 20 мг.

вспомогательное вещество - тальк.

Без ГМО.

Описание

«Лив-Кер®» является комбинированным гепатопротектором растительного происхождения, способствующим защите гепатоцитов от воздействия вредных факторов, стимулирующих регенерацию гепатоцитов и синтез белка. Препарат способствует нормализации выработки и выделения желчи.

Особенности

- Проявляет гепатопротекторную, антитоксическую, противовоспалительную, желчегонную активность;
- улучшает процесс пищеварения, стимулирует гемопоэз;
- при алкогольном поражении печени способствует увеличению вывода ацетальдегида;
- при хроническом алкоголизме препятствует инфильтрации липидов в печень;
- обеспечивает защиту печени от 4-хлористого углерода;
- при циротичных состояниях задерживает развитие заболевания и препятствует дальнейшему повреждению печени;
- стимулирует синтез белков, способствует регенерации клеток печени, восстанавливает функциональную способность;
- улучшает аппетит, способствует отхождению газов из кишечника;
- увеличивает массу тела при истощении.

Показания

- Для профилактики и лечения хронических диффузных заболеваний печени, алкогольного поражения печени, радиоактивных и химиотерапевтических поражений печени;
- как способ повышения стойкости при гепатотоксических поражениях печени;
- для ускорения выздоровления в период реконвалесценции после тяжелых заболеваний, операций;
- холецистоангиохолиты и дискинезии желчевыводящих путей.

Противопоказания

Не принимать при повышенной чувствительности к отдельным компонентам.

Дети возрасте до 5-ти лет.

Отсутствуют клинические данные о безопасности препарата для беременных и женщин, которые кормят грудью.

Способ применения и дозы

Рекомендуемая дозировка:

- взрослым и детям старше 14-ти лет - по две таблетки 3 раза в сутки.
- детям от 5-ти до 14-ти лет - по одной таблетке 3 раза в сутки.

Длительность лечения определяет врач в зависимости от заболевания и степени тяжести заболевания.

Меры предосторожности

Не является лекарственным средством.

Перед применением рекомендуется консультация врача.

Если Вы принимаете любые другие лекарственные средства, обязательно проконсультируйтесь с врачом относительно использования препарата.

При одновременном применении «Лив-Кер[®]» и ибупрофена уровень последнего в организме уменьшается в следствии задержки всасывания.

При одновременном применении с тетрациклином или доксициклином уменьшается биодоступность антибиотиков.

Побочные реакции

Возможны диспептические явления, проявления аллергических реакций (в случае появления каких-либо нежелательных реакций необходимо посоветоваться с врачом относительно дальнейшего применения препарата).

Условия хранения

Хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от +10 °С до +30 °С.

Упаковка

По 60 таблеток в банке; по 1 банке в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

LOBSTER OVERSEAS