

Состав

действующее вещество: аммиак;

100 мл раствора содержат 10 г аммиака;

вспомогательные вещества: вода очищенная.

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения.

Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная, летучая, очень щелочная жидкость с резким запахом. Допускается, при хранении, наличие блесков и / или легкой мути.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, влияющие на респираторную систему. Код АТХ R07A B.

Фармакодинамика

Раствор аммиака относится к лекарственным средствам, которые раздражают нервные окончания. Механизм действия аммиака при вдыхании заключается в рефлекторном возбуждении дыхательного центра через рецепторы верхних дыхательных путей - окончание тройничного нерва.

При нанесении на кожу оказывает раздражающее и антимикробным действием.

Фармакокинетика

Препарат поступает в кровяное русло.

Показания

Обморочное состояние, при укусах насекомых.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к лекарственному средству.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не установлена.

Особенности применения

Местное применение возможно только на неповрежденную кожу.

При случайном поражении слизистой оболочки глаза промывать водой несколько раз (в течение 15 минут с перерывом 10 минут) или 3% раствором борной кислоты. Масла и мази не применяют. При поражении носа и глотки применяют 0,5% раствор лимонной кислоты или натуральные соки. В случае приема внутрь - пить воду, фруктовый сок, молоко, лучше - 0,5% раствор лимонной кислоты или 1% раствор уксусной кислоты до полной нейтрализации содержимого желудка.

Не следует нарушать правила применения лекарственного средства, это может повредить здоровью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

В период беременности и кормления грудью применение препарата возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Для возбуждения дыхательного центра как средство скорой помощью: небольшой кусочек марли или ваты, смоченный раствором аммиака, осторожно подносят к носовым отверстиям на 0,5 - 1 с.

При укусах насекомых раствор аммиака применяют наружно в виде примочек (продолжительность процедуры - до 30 секунд).

Дети

Препарат применяют детям до 3 лет.

Передозировка

Усиление проявлений побочных реакций. Терапия симптоматическая.

Побочные реакции

При вдыхании паров аммиака может возникнуть рефлекторная остановка дыхания.

При местном применении возможны раздражение, дерматиты, экзема в месте аппликации, аллергические реакции.

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.

Срок годности

2 года.

Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 40 мл во флаконе без пачки.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

69063, Украина, г. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника —

Государственного реестра лекарственных средств Украины.