

Состав

1 таблетка содержит:

активные ингредиенты: экстракт травы пастушьей сумки - 200 мг (mg),
экстракт коры калины - 150 мг (mg), рутин (рутозид) - 50 мг (mg);

вспомогательные вещества: наполнители: целлактоза-80, натрия
кроскармеллоза, магния стеарат оболочка таблетки: сухая смесь;

оболочка таблетки: гидроксипропилметилцеллюлоза, полиэтиленгликоль,
титана диоксид, рибофлавин, оксид железа красный.

Лекарственная форма

Добавка диетическая на основе растительного сырья.

Фармакологические свойства

Добавка содержит комбинацию натуральных растительных экстрактов и рутину, которые способствуют нормализации течения менструации.

Экстракт травы пастушьей сумки содержит флавоноиды (кверцетин, диосмин, гесперидин и т.д.), аминокислоты, сапонины, витамин С, каротиноиды и другие вещества, благодаря чему проявляет кровоостанавливающие свойства; способствует улучшению перистальтики кишечника; применяется при атонии матки, маточных кровотечениях, длительных и обильных месячных, в том числе, в предменопаузальный период.

Экстракт коры калины содержит витамины (С, К, каротин), флавоновый гликозид вибурнин и дубильные вещества, которые обуславливают кровоостанавливающие, а также слабые мочегонные свойства, благодаря чему кора калины применяется при дисменорее (болезненных менструациях).

Рутин способствует уменьшению проницаемости и ломкости стенок капилляров, благодаря чему может положительно влиять на эластичность сосудов, способствовать уменьшению кровопотери, обеспечивать ангиопротекторные свойствами, оказывает ранозаживляющее и противовоспалительное действие.

Показания

Рекомендуется употреблять как дополнительный источник витаминов (К, С, бета-каротина, рутина), дубильных веществ, флавоноидов (вибурнин) с целью нормализации функционального состояния женских репродуктивных органов при меноррагиях (обильных менструациях).

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, беременность и период лактации, нарушения в системе свертывания крови, тромбофлебиты, склонность к тромбозам.

Особенности применения

Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Добавку диетическую не следует использовать как замену полноценного рациона питания.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применение противопоказано.

Способ применения и дозы

Принимать взрослым (женщинам) по 1 таблетке 2 раза в сутки независимо от приема пищи; запивая достаточным количеством питьевой воды. Рекомендуется начинать применение за 3-7 дней до начала менструации и продолжать до ее завершения. Перед применением рекомендуется консультация врача.

Срок годности

24 месяца от даты производства.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, недоступном для детей месте при температуре от 0 ° С до 25 ° С.

Упаковка

По 10 таблеток в блистере, по 3 блистера в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ПАО «Киевмедпрепарат».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 01032, г. Киев, ул. Саксаганского, 139.