

Состав

действующие вещества: 1 таблетка содержит: Agnus castus - 162 мг, Caulophyllum thalictroides D4 - 81 мг, Cyclamen purpurascens D4 - 81 мг, Strychnos ignatia D6 - 81 мг, Iris versicolor D2 - 162 мг, Lilium tigrinum D3 - 81 мг;

вспомогательные вещества: крахмал картофельный, лактоза, магния стеарат.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: круглые плоские таблетки бежевого цвета, допускаются вкрапления.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Лекарственное средство для применения в гинекологической практике. Под влиянием компонентов препарата происходит снижение концентрации пролактина в крови и проявляется нормализующее действие на баланс половых гормонов.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания

В комплексном лечении предменструального синдрома: психическая лабильность, головная боль или мигрень, отеки, запоры, мастодиния перед началом менструации, нарушения менструального цикла и фиброзно-кистозная мастопатия.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, включая вспомогательные вещества.

Препарат не следует принимать больным с наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или нарушением всасывания глюкозы-галактозы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не исключено взаимодействие с агонистами дофамина, антагонистами дофамина, эстрогенами и антиэстрогенами из-за возможных дофаминергических и эстрогенных эффектов прутняка обычного.

Общие замечания.

На эффективность гомеопатических препаратов могут негативно влиять нездоровый образ жизни, потребление возбуждающих средств и стимуляторов (например, кофе).

В случае приема других препаратов следует обратиться за консультацией к врачу.

Особенности применения

Пациентам, имеют или имели эстрогензависимость опухоли, следует проконсультироваться с врачом перед применением лекарственного средства Мастодион®, таблетки.

Применение таблеток Мастодион® пациентам, которые применяют агонисты дофамина, антагонисты дофамина, эстрогены и антиэстрогены, возможно только после консультации с врачом (смотрите раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

В случае ухудшения симптомов во время лечения необходимо обратиться к врачу.

Пациентам, имеющим в анамнезе расстройства гипофиза, следует обратиться к врачу перед применением препаратов, содержащих прутняк обычный.

При наличии пролактин-секретирующих опухолей гипофиза, применение плодов прутняка обычного может маскировать симптомы опухоли.

Лекарственное средство Мастодион®, таблетки, не следует применять до начала регулярных менструаций в период полового развития.

Примечание для больных диабетом. 1 таблетка Мастодинон® содержит в среднем 0,020 ХЕ. Препарат не содержит глютенa.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Сведений о непосредственном влиянии препарата на управление автотранспортом или другими механизмами нет. В случае возникновения головокружения следует воздержаться от управления автотранспортом или другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Терапевтических показаний для применения во время беременности нет, поэтому не следует применять препарат во время беременности.

Данные репродуктивных исследований указывают на то, что прутняк обыкновенный (*Agnus castus*) влияет на лактацию. Применение в период лактации не рекомендуется.

Прутняк обыкновенный (*Agnus castus*) может влиять на женскую способность к воспроизводству потомства, регулируя менструальный цикл.

Способ применения и дозы

Если не назначено иначе, препарат принимать по 1 таблетке два раза в день (утром и вечером) с небольшим количеством воды (например, стаканом воды).

Если симптомы не исчезают или усиливаются при применении лекарственного средства, следует обратиться за консультацией к врачу.

Дети

Нет данных о применении этого препарата детям. Детям и подросткам в возрасте до 18 лет не следует применять таблетки Мастодинон®.

Передозировка

При применении в высоких дозах, значительно превышающих рекомендуемые, возможны желудочно-кишечные расстройства или слабительный эффект у больных с непереносимостью лактозы.

Лечение: симптоматическая терапия.

Побочные реакции

Были сообщения о тяжелых аллергических реакциях с отеком лица, одышкой и затруднением глотания. Возможны аллергические реакции, включая кожная сыпь, зуд, крапивница, головная боль и головокружение, желудочно-кишечные жалобы (такие, как тошнота, боль в животе), акне, а также нарушения менструального цикла.

Применение гомеопатических лекарственных средств может привести к временному усилению имеющихся симптомов (первоначальное обострения).

При первых признаках каких-либо побочных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

4 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте.

Для этого лекарственного препарата не нужны какие-либо специальные температурные условия хранения.

Упаковка

По 20 таблеток в блистере, по 3 блистера в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Бионорика CE/ Bionorica SE.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Керхенштейнерштрассе, 11-15, 92318, м. Ноймаркт,
Германия/Kerschensteinerstrasse, 11-15, 92318 Neumarkt, Germany.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника —
[Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).