

Состав

действующее вещество: 1 г (27 капель) препарата содержит экстракта жидкого из лекарственного растительного сырья: золототысячника травы (*Herba Centaurii*), розмарина лекарственных листьев (*Folia Rosmarini officinalis*), любистка лекарственного корня (*Radix Levistici officinalis*) (1:1:1) 1:16) (экстрагент: этанол 59%) – 290 мг;

вспомогательное вещество (кроме экстрагента): очищенная вода.

Лекарственная форма

Капли оральные.

Основные физико-химические свойства: прозрачная слегка мутная жидкость желто-коричневого цвета со специфическим запахом. Допускается легкая опалесценция или выпадение незначительного осадка в процессе хранения.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые в урологии. Код АТХ G04В Х.

Фармакодинамика

Компоненты, входящие в состав растительного лекарственного средства, проявляют комплексную активность, проявляющуюся в противовоспалительном, антиоксидантном, спазмолитическом и обезболивающем действии. Также препарат имеет антибактериальный и диуретический эффекты, обусловленные веществами, содержащимися в растительных компонентах препарата.

Показания

Для комплексного лечения воспалительных заболеваний мочевыводящих путей.

Профилактика образования мочевых камешков, в том числе и после их удаления.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к любому компоненту препарата или другим растениям семейства Зонтичные (*Apiaceae*), например, анис, фенхель, и к анетолу (т.е. компоненту эфирных масел, содержащих, например, анис и фенхель).

Пептическая язва на стадии обострения.

Отеки вследствие сердечной недостаточности или нарушения функции почек и/или при рекомендованном уменьшении потребления жидкости.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

В случае необходимости одновременного применения любых других лекарственных средств следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Особенности применения

При хранении препарата возможно помутнение или выпадение осадка, однако это не влияет на действие препарата.

В случае продолжения лихорадки, спазмов, появления крови в моче, расстройств мочеиспускания и острой задержки мочи необходимо немедленно обратиться к врачу.

Это лекарственное средство содержит 13,73-14,92% этанола (алкоголя), то есть 254-276 мг/дозу. Препарат не следует принимать пациентам, страдающим алкоголизмом, а также пациентам, завершившим лечение от алкоголизма. Содержание алкоголя в препарате необходимо учитывать при применении пациентам с высоким риском, таким как заболевания печени, эпилепсия, заболевания мозга. С осторожностью использовать детям.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат в рекомендуемых дозах не влияет на способность управлять транспортом и работать с другими механизмами, но следует учитывать, что препарат содержит этанол.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность

Экспериментальные отрицательные результаты непосредственного или косвенного действия препарата не выявлены. В настоящее время существует ограниченный опыт применения препарата беременным женщинам. Поэтому из соображений безопасности следует избегать применения препарата в период беременности.

Кормление грудью

В связи с отсутствием данных о попадании препарата или его метаболитов в молоко матери риск для младенцев не может быть исключен. Поэтому препарат не следует применять в период кормления грудью.

Способ применения и дозы

Если врач не назначил иначе, препарат следует принимать взрослым и детям от 12 лет по 50 капель 3 раза в сутки (общая суточная доза – 150 капель).

Взрослым пациентам капли принимать в неразбавленном виде. Если нужно (например: горький вкус для детей), капли принимать с добавлением любой жидкости. Перед употреблением взболтать! При накапливании препарата флакон следует держать вертикально.

Одновременно с приемом препарата необходимо обеспечить потребление достаточного количества жидкости.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально. Если препарат хорошо переносится, его можно назначать на длительный срок.

Дети

Препарат не следует применять детям до 12 лет.

Передозировка

Случаи отравления препаратом в результате его передозировки неизвестны. Терапия симптоматическая.

Побочные реакции

Часто случаются нарушения со стороны пищеварительного тракта (тошнота, рвота, диарея). Могут возникать аллергические реакции при повышенной чувствительности к составляющим компонентам препарата, включая сыпь, крапивницу, зуд, гиперемию кожи.

При возникновении любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности препарата после вскрытия флакона – 6 месяцев.

Упаковка

По 100 мл во флаконе, укупоренном пробкой-капельницей и крышкой, в коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания Здоровье».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).