

Состав

Экстракта корня крапивы двудомной – 250 мг, экстракта плодов пальмы пилообразной – 160 мг, цинка аспарагината – 5 мг.

Вспомогательные вещества: глазурирующий агент поливинилпирролидон, антисжигающие кремния диоксид, тальк, консервант натрия бензоат.

Капсула: желатин, вода очищенная, красители понсо 4R, диоксид титана, кармоизин, консерванты метилпарабен и пропилпарабен.

Свойства активных веществ

Экстракт плодов пальмы пилообразной способен блокировать связывание дигидротестостерона с андрогеновыми рецепторами, что приводит к торможению роста предстательной железы. Активные вещества пальмы пилообразной обладают противоотечной и спазмолитической активностью, что способствует уменьшению обструкции мочевыводящих путей и предотвращает развитие воспалительных процессов в тканях предстательной железы.

Экстракт корня двудомной крапивы содержит комплекс биологически-активных веществ, среди которых стероиды, витамины (К, С, В, каротиноиды), фенольные соединения, жирные кислоты, полисахариды, микроэлементы (железо, кальций, медь, фосфор и др.). Данный комплекс полезных соединений способствует уменьшению воспалительных процессов простаты, а также ингибирует ее гиперплазию.

В комплексе с экстрактом плодов пальмы пыльцевидной двудомной крапивы улучшает качество жизни мужчин с признаками расстройств мочеиспускания на фоне дисфункции предстательной железы.

Дополнительными эффектами экстракта крапивы являются благоприятное влияние на уровень глюкозы в крови, показатели липидного обмена и иммуномодулирующее действие.

Цинка аспарагинат. Цинк – микроэлемент, играющий важную роль в нормальном функционировании предстательной железы. Доказано, что метаболизм андрогенов в тканях простаты зависит прежде всего от внутриклеточной концентрации цинка.

Показания

Нормопрост может быть рекомендован как источник биологически активных веществ растительного происхождения для предупреждения расстройств мочеиспускания и нормализации функционирования предстательной железы у мужчин.

Перед употреблением Нормопрост необходимо проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к компонентам.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день. Положительная динамика функции мочеиспускания наблюдается с 7 недели непрерывного приема и приобретает стабильный эффект с 6 месяца применения. В дальнейшем продолжительность и схемы применения согласуются с лечащим врачом.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.

Упаковка

По 15 капсул в блистере, по 2 блистера в упаковке.

Производитель

Ананта Медикаер Лимитед.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

621, Ринг Рoad Малл, Сектор-3, Рохи́ни, Нью-Дели-110085, Индия.