

Состав

действующие вещества: хлорбутанол гемигидрат; камфора рацемическая; ментол.

1 баллон содержит хлорбутанола гемигидрата (в пересчете на 100% безводное вещество) - 0,1 г; камфоры рацемической - 0,1 г; ментола - 0,1 г;

вспомогательные вещества: масло эвкалиптовое, изопропилмиристат, тетрафторэтан.

Лекарственная форма

Аэрозоль.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость, которая находится под давлением в баллоне с клапаном дозирующей действия и при выходе из баллона образует дисперсный поток с характерным ароматным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, действующие на респираторную систему. Препараты, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики. Разные.

Код АТХ R02AA20.

Фармакодинамика

Каметон проявляет антимикробное, противовоспалительное и незначительную местноанестезирующее действие, способствует нормализации дыхания больных. Лекарственное средство сужает сосуды, а также уменьшает кровенаполнение и отек пораженного участка. Сочетание указанных фармакологических свойств обеспечивает комплексную патогенетическую терапию воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей. Каметон не проявляет ulcerогенного и общетоксического действия на организм.

Фармакокинетика

Каметон предназначен для местного применения и образует терапевтическую концентрацию, главным образом, в очаге воспаления. Медленно и в незначительном количестве в системный кровоток всасывается лишь

хлоробутанолгидрат и камфора, которые обратимо связываются с белками крови. При биотрансформации образуются глюкурониды, посредством которых они выводятся почками.

Показания

Местное лечение острых и хронических (преимущественно в стадии обострения) инфекционно-воспалительных заболеваний горла и носа: тонзиллита, фарингита, ларингита, ринита.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Возраст до 5 лет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не описано. В случае необходимости одновременного применения каких-либо лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Особенности применения

- Перед применением Каметон ротовую полость нужно прополоскать теплой кипяченой водой, лекарственное средство следует применять после еды. При ожогах с пораженных участков стерильным тампоном снять некротический налет.
- Баллон с препаратом не разбирать и не давать детям, оберегать от ударов, не распылять у огня.
- После применения препарата на распылитель надеть защитный колпачок, чтобы предотвратить его загрязнение.
- При впрыскивании в нос не забрасывать голову и не переворачивать баллон. Не рекомендуется пользоваться одним и тем же баллоном нескольким лицам, чтобы избежать распространения инфекции. При распылении препарата следует избегать его попадания в глаза.
- Перед применением препарата лицам, склонным к аллергии, надо обязательно посоветоваться с врачом.
- Препарат следует с осторожностью применять детям, поскольку возможно развитие бронхоспазма. Лечение детей следует проводить под наблюдением врача.
- Перед введением препарата в полость носа следует очистить нос от слизи. При обработке слизистых оболочек горла препарат следует применять после еды.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Данные отсутствуют.

Применение в период беременности или кормления грудью

Противопоказаний по применению препарата в период беременности и кормления грудью не обнаружено, но применять препарат в этот период следует по назначению врача.

Способ применения и дозы

Применять взрослым и детям старше 5 лет. Препарат применять местно на слизистые оболочки и пораженные участки полости горла и носа. Доза препарата для взрослых и детей старше 15 лет составляет 2-3 впрыскивания в полость горла и по 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю, детям в возрасте от 5 до 12 лет - 1-2 впрыскивания в полость горла и по 1 впрыскиванию в каждую ноздрю, детям в возрасте от 12 до 15 лет - 2 впрыскивания в полость горла и по 1 впрыскиванию в каждую ноздрю. Препарат применять 3-4 раза в сутки. Продолжительность лечения определяется врачом индивидуально и зависит от интенсивности терапии (обычно составляет 3-10 суток). Препарат не следует применять дольше 2 недель.

Правила пользования баллоном

1. Надеть распылитель на шток клапана.
2. Снять защитный колпачок с распылителя.
3. Свободный конец распылителя вставить в полость носа на глубину 0,5 см или направить на пораженный участок горла и нажать на распылитель. При впрыскивании в нос не переворачивать баллон.
4. Закончив орошение, закрыть распылитель защитным колпачком, чтобы предотвратить его загрязнение.

Дети

Применять детям в возрасте от 5 лет под наблюдением врача.

Передозировка

Передозировка препарата может вызвать аллергические реакции.
Передозировка препарата может вызвать усиление побочных эффектов.
ОСОБЫЕ.

Лечение: прекращение применения препарата, симптоматическая терапия.

Побочные реакции

Лекарственное средство обычно хорошо переносится, но иногда могут возникать реакции, обусловленные повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата, включая жжение / раздражение в горле, отек в месте контакта, сухость слизистой оболочки носа / горла, одышку, отечность лица, языка, кожные высыпания, крапивницу, зуд.

При возникновении каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Запрещается применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ° С.

Упаковка

По 30 г в баллоне аэрозольном; по 1 баллона в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «Микрофарм».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 61013. Харьков, ул. Шевченко, 20.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника —

Государственного реестра лекарственных средств Украины.