

## **Состав**

*действующее вещество:* ambazone;

1 леденец прессованный содержит амбазона моногидрата 10 мг;

*вспомогательные вещества:* сахароза, лактоза, какао, повидон К-30, стеариновая кислота, ванилин.

## **Лекарственная форма**

Леденцы прессованные.

*Основные физико-химические свойства:* коричневые, не покрытые оболочкой, цилиндрической формы леденцы прессованные, с неповрежденными краями, плоские и с пигментированной поверхностью.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики. Амбазон. Код АТХ R02A A01.

## **Фармакодинамика**

Амбазон является местным антисептиком, который имеет высокую активность в отношении патогенных микроорганизмов, чаще всего вызывают инфекции ротовой полости и верхних дыхательных путей: стрептококков, пневмококков, - а также умеренную противостафилококковую активность. Не влияет на кишечную микрофлору, следовательно, не вызывает дисбактериоза пищеварительного тракта.

Кроме того, применение леденцов прессованных увеличивает слюноотделение и выделение природных бактерицидных веществ организма (таких как лизоцим) и вместе с этим увлажняет слизистую оболочку, уменьшает раздражение.

## **Показания**

- Симптоматическое лечение инфекций слизистой оболочки полости рта и носоглотки: гингивит, стоматит, тонзиллит, ангина, фарингит.
- Профилактика инфекционных осложнений после тонзиллэктомии и экстракции зубов.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

В настоящее время не сообщалось о взаимодействии препарата с любыми другими лекарственными средствами.

## **Особенности применения**

Поскольку леденцы Фарингосепт содержат сахарозу и лактозу, пациентам с редкими наследственными формами непереносимости фруктозы или галактозы, синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы, недостаточностью сахаразы-изомальтазы или дефицитом лактазы Лаппа следует избегать применения препарата.

Больным сахарным диабетом следует учитывать, что леденцы содержат сахарозу.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать со сложными механизмами.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Нет контролируемых клинических исследований на счет применения амбазона в период беременности или кормления грудью. Однако, не поступало никаких данных о побочных реакциях или вредном воздействии на плод при применении амбазона в период беременности. Неизвестно, проникает амбазон в грудное молоко.

Леденцы Фарингосепт можно назначать в период беременности и кормления грудью только в том случае, если, по мнению врача, терапевтический эффект для матери превышает потенциальный риск для плода.

### **Способ применения и дозы**

Рекомендуемая доза *для взрослых и детей от 7 лет* составляет 3-5 леденцов (30-50 мг амбазона) в течение не менее 3-4 дней.

Леденцы не следует глотать - их следует медленно растворить слюной в полости рта. Препарат обычно применяют сразу после еды (через 15-30 минут), после чего в течение 2-3 часов не следует принимать пищу и пить.

Рекомендуемая доза *детям 3-7 лет* - по 1 леденцу 3 раза в сутки (30 мг амбазона в сутки) в течение 3-4 дней.

Увеличение рекомендованной дозы не вызывает улучшение терапевтического эффекта.

### **Дети**

Не применять детям до 3 лет.

### **Передозировка**

До сих пор не было зафиксировано случаев передозировки препаратом. Специфического антидота не существует. При применении очень большого количества леденцов Фарингосепт рекомендуется вызвать рвоту и / или промыть желудок.

### **Побочные реакции**

Возможны реакции гиперчувствительности, в том числе отек Квинке, крапивница, зуд, гиперемия кожи лица, сыпь.

### **Срок годности**

2 года.

**Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Упаковка**

По 10 леденцов в блистере, по 2 блистера в картонной коробке.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

УК Терапия АО

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

ул. Фабрицио, 124, 400 632, г. Клуж-Напока, округ Клуж, Румыния

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).