

Состав

действующие вещества: 1 баллон (30 мл) содержит стрептоцида растворимого 0,75 г; сульфатиазола натрия гексагидрата 0,75 г; тимола 0,015 г; масла эвкалиптового 0,015 г; масла мяты перечной 0,015 г;

вспомогательные вещества: этанол 96 %, сахар, глицерин, полисорбат 80, вода очищенная, азот – давление до 0,6 МПа.

Лекарственная форма

Аэрозоль.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета, с характерным запахом тимола и ментола.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, действующие на респираторную систему. Препараты, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики. Код АТХ R02A A20.

Фармакодинамика

Ингалипт – комбинированный препарат, который оказывает противовоспалительное, противомикробное, охлаждающее и отвлекающее действие. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания

Инфекционно-воспалительные заболевания ЛОР-органов и слизистой оболочки полости рта: тонзиллит, фарингит, ларингит, афтозный и язвенный стоматиты.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к любым компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При одновременном применении Ингалипта с препаратами, являющимися производными п-аминобензойной кислоты (новокаин, анестезин, дикаин), происходит инаktivация антибактериальной активности сульфаниламидов.

Особенности применения

Перед применением препарата рекомендуется прополоскать полость рта теплой кипяченной водой. С пораженных участков полости рта (язвы, эрозии) с помощью стерильных тампонов удалить некротический налет.

После орошения полости рта препаратом следует удерживаться от приема пищи в течение 15-30 минут.

Перед применением препарата лицам, склонным к аллергии и больным сахарным диабетом (поскольку препарат содержит сахар), необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.

Перед применением необходимо снять защитный колпачок с баллона и на шток клапана надеть распылитель, имеющийся в комплекте. Затем свободный край распылителя ввести в полость рта и нажимать на головку клапана в течение 1-2 секунд, удерживая баллон вертикально. С целью избежания закупорки распылителя по окончании манипуляции его необходимо продуть или поместить в стакан с чистой водой. Закрыть баллон защитным колпачком во избежание его загрязнения.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Водителям автотранспорта и операторам механизмов необходимо применять препарат с осторожностью в связи с тем, что препарат содержит спирт этиловый. Препарат может искажать результаты исследования на алкоголь.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применение препарата в период беременности или кормления грудью возможно под контролем врача, взвесив соотношение польза/риск, строго соблюдая режим дозирования препарата.

Способ применения и дозы

Применять взрослым и детям с 3 лет местно, путем орошения слизистых оболочек полости рта и носоглотки.

Перед применением препарата на аэрозольный баллон необходимо надеть распылитель, несколько раз встряхнуть баллон, после чего путем нажатия распылителя до упора равномерно орошать препаратом пораженный участок.

За один сеанс ингаляции осуществлять 2-3 распыления, удерживая препарат в полости рта 5-7 минут. Орошения проводить 3-4 раза в сутки.

Продолжительность применения препарата зависит от интенсивности терапии и обычно составляет 7-10 суток.

Дети

Препарат не применять детям до 3 лет.

У детей возможно возникновение рефлекторного бронхоспазма в связи с наличием в составе препарата эвкалиптового масла и масла мяты перечной. Лечение детей следует проводить под наблюдением врача. Применять препарат детям с 3 лет, учитывая возможность развития рефлекторного бронхоспазма.

Передозировка

В случае передозировки возможно усиление побочных эффектов препарата.

При всех случаях передозировки необходимо отменить применение препарата, прополоскать полость рта теплой кипяченной водой.

Лечение – симптоматическое.

Побочные реакции

Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая зуд, крапивницу, высыпания на коже, отек в месте контакта, у лиц с повышенной чувствительностью возможно развитие ангионевротического отека (отек Квинке).

Со стороны дыхательной системы: затруднение дыхания; возможно возникновение рефлекторного бронхоспазма, обусловленного содержанием эфирных масел.

Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота.

Местные эффекты: ощущение жжения во рту или першения, или комка в горле, гиперемия слизистой оболочки зева.

Другое: общая слабость.

В случае выявления каких-либо нежелательных явлений или необычных реакций следует проконсультироваться с врачом относительно дальнейшего применения препарата.

Срок годности

2 года.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Предохранять от падений, ударов, воздействия прямых солнечных лучей.

Упаковка

По 30 мл в баллоне аэрозольном алюминиевом; по 1 баллону с распылителем в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

АО «Стома», Украина.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Україна, 61105, м. Харків, вул. Ньютона, 3.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).