

## **Состав**

*действующие вещества:* стрептоцид растворимый, сульфатиазол натрия гексагидрат;

1 баллон содержит стрептоцида растворимого 0,75 г, сульфатиазола натрия гексагидрата 0,75 г;

*вспомогательные вещества:* тимол, масло мяты перечной, масло эвкалиптовое, глицерин, этанол 96%, полисорбат 80, сахароза, вода очищенная.

## **Лекарственная форма**

Спрей для полости рта.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета со специфическим запахом.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, действующие на респираторную систему. Препараты, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики. Различные антисептики.

Код АТХ R02A A20.

## **Фармакодинамика**

Ингалипт-Н оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие, а также охлаждающую и отвлекающее действие. Сочетание указанных фармакологических свойств обеспечивает комплексную патогенетическую терапию воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и слизистой оболочки ротовой полости. Ингалипт-Н не оказывает ulcerогенного и общетоксического действия на организм.

## **Фармакокинетика**

Ингалипт-Н предназначен для местного ингаляционного применения и создает терапевтическую концентрацию главным образом в очаге воспаления. В системный кровоток частично всасываются сульфаниламиды (стрептоцид растворимый и норсульфазол натрия), которые обратимо связываются с белками крови: стрептоцид растворимый - на 12-14%, норсульфазол натрия - на 55%. В процессе биотрансформации образуются ацетилированные формы

сульфаниламидов, посредством которых они выводятся почками. Период полувыведения стрептоцида растворимого составляет 10 часов, норсульфазола натрия - 1,2 часа.

## **Показания**

Местное лечение инфекционно-воспалительных заболеваний ЛОР-органов и слизистой оболочки полости рта (тонзиллит, фарингит, ларингит, афтозный и язвенный стоматиты).

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, наличие в анамнезе тяжелых токсико-аллергических реакций на сульфаниламиды.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Если вы принимаете любые другие лекарственные средства, обязательно проконсультируйтесь с врачом о возможности дальнейшего применения препарата!

Возможно ослабление противомикробного действия лекарственного средства при одновременном применении с препаратами - производными парааминобензойной кислоты (новокаин, анестезин, дикаин).

## **Особенности применения**

*Перед применением препарата лицам со склонностью к аллергии следует проконсультироваться с врачом!*

*Без консультации врача не применяйте препарат сверх установленного срока!*

*Обязательно сообщите врачу о предыдущей реакции на прием препаратов этой группы.*

Не допускать попадания препарата в глаза.

Перед первым применением сделать до 7 нажатий на насадку до появления дисперсной струи. Разрешается при отсутствии струи повторить действия еще раз.

Перед применением препарата рекомендуется прополоскать полость рта теплой кипяченой водой. С пораженных участков полости рта (язвы, эрозии) с помощью

стерильных удалить некротический налет.

После орошения полости рта препаратом следует воздерживаться от приема пищи в течение 15-30 мин.

После применения препарата снять горловой распылитель со штока и промыть его теплой водой. Закрыть баллон защитным колпачком, чтобы предотвратить его загрязнение.

При применении препарата детям следует учитывать, что однократная доза, которая распыляется за 1-2 распыления, содержит 0,0076-0,0152 мл этанола (96%), что составляет на однократный прием: для детей 3-5 лет (масса тела 15-21 кг) 0,0004-0,0013 мл/кг, 6-12 лет (масса тела 21-38 кг) 0,0002-0,0007 мл/кг.

Поскольку препарат содержит сахарозу, пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы, синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции или недостаточностью сахараз-изомальтазы не следует применять этот препарат.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами, однако водителям автотранспорта следует учитывать возможное искажение результатов исследования на алкоголь.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Применение препарата в период беременности и кормления грудью возможно под контролем врача после оценки, учитывая соотношение польза/риск со строгим соблюдением режима дозирования.

### **Способ применения и дозы**

*Применять взрослым и детям старше 3 лет* местно на слизистые оболочки полости рта и носоглотки путем орошения.

*Взрослым* орошения проводить 3-4 раза в сутки.

*Детям в возрасте от 3 лет* орошения проводить 1-2 раза в сутки, если нет особых указаний врача.

Продолжительность применения препарата зависит от течения заболевания и обычно составляет 3-10 суток.

Частота и длительность применения устанавливаются индивидуально врачом и зависит от тяжести заболевания!

## **Дети**

Препарат не применять детям до 3 лет. С осторожностью применять детям в возрасте от 3 лет в связи с возможностью развития рефлекторного бронхоспазма, обусловленного содержанием эфирных масел эвкалипта и мяты перечной. Лечение детей следует проводить под наблюдением врача.

## **Передозировка**

Случаи передозировки не описаны. Возможно усиление побочных эффектов.

*Лечение:* отмена препарата, полоскание полости рта теплой кипяченой водой.

Симптоматическая терапия.

## **Побочные реакции**

*Со стороны иммунной системы:* аллергические реакции, включая ангионевротический отек, бронхоспазм.

*Со стороны кожи:* сыпь, зуд, крапивница, отек в месте контакта.

*Со стороны пищеварительной системы:* тошнота, рвота, местные эффекты (жжение во рту, ком в горле или раздражение).

*Другие:* общая слабость, затруднение дыхания.

В случае выявления каких-либо нежелательных явлений или необычных реакций следует посоветоваться с врачом относительно дальнейшего применения препарата.

## **Срок годности**

2 года.

Запрещается применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

## **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте, подальше от огня.

**Упаковка**

По 30 г в баллоне алюминиевом с распылителем и защитным колпачком.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

ООО «Микрофарм».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 61013, г. Харьков, ул. Шевченко, 20.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).