

Состав

действующее вещество: экстракт жидкий (60: 100) цветов подсолнечника (flores helianthi) (экстрагент - этанол 70%);

1 мл препарата содержит экстракта жидкого (60: 100) цветов подсолнечника (flores helianthi) (экстрагент - этанол 70%) (в пересчете на сухое вещество) 330 мг;

вспомогательные вещества: пропиленгликоль; метилпарабен (Е 218) пропилпарабен (Е 216) сахарин натрия кислота лимонная моногидрат, вода очищенная.

Лекарственная форма

Спрей оромукозний, раствор.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость желто-коричневого цвета со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты, применяемые при заболеваниях горла. Различные антисептики.

Код АТХ R02A A20.

Фармакодинамика

Экстракт цветов подсолнечника - антибактериальный препарат природного происхождения. Биологически активные вещества, содержащиеся в нем содержатся, подавляют рост некоторых бактерий (*Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Bacillus subtilis*), а также вирус везикулярного стоматита. Кроме того, при местном применении препарат оказывает выраженное ранозаживляющее действие.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания

Острые респираторные заболевания, ангины, ларингиты, фарингиты, профилактика везикулярного стоматита.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Препарат усиливает действие других антибактериальных препаратов.

Особенности применения

Флакон встряхивают в течение 1 мин и проводят не более 5 нажатий на насадку до появления дисперсной струи. Разрешается при отсутствии струи повторить операцию еще раз. Затем свободный конец распылителя ввести в полость рта и нажимать на головку клапана в течение 1-2 с, удерживая флакон вертикально.

Вспомогательные вещества могут вызвать аллергические реакции (возможно замедленные), а в отдельных случаях - бронхоспазм.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Поскольку никаких исследований применения препарата в период беременности и кормления грудью не проводилось, его применение не рекомендуется.

Способ применения и дозы

Местно, путем орошения, на слизистые оболочки ротовой полости и носоглотки. Взрослым орошения проводят 3-4 раза в сутки. Длительность лечения зависит от интенсивности терапии и обычно составляет от 3 до 7 суток.

Дети

Исследования по применению детям не проводились, поэтому препарат не рекомендуется.

Передозировка

Не наблюдалось.

Побочные реакции

Вспомогательные вещества могут вызвать аллергические реакции (возможно замедленные), а в отдельных случаях - бронхоспазм. Возможно возникновение ощущения жжения в задней части глотки, не требует отмены препарата.

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 30 мл во флаконе с насосом-дозатором с распылителем, по 1 флакону в пачке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Биолик».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 02660, г. Киев, ул. Старосельская, 1 В.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).