

Состав

действующее вещество: 100 мл раствора содержат не менее 69,3% об/об и не более 70,7% об/об этанола (C₂H₆O);

вспомогательные вещества: вода очищенная.

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения.

Прозрачная, бесцветная, летучая, легковоспламеняющаяся жидкость.
Гигроскопична.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТХ D08A X08.

Фармакодинамика

При наружном применении оказывает антисептическое, дезинфицирующее, местно раздражающее действие. Этанол коагулирует белки, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов.

Фармакокинетика

При местном применении не всасывается через кожу.

Показания

1. Фурункулы, панариции, инфильтраты, маститы на начальных стадиях.
2. Для обтирания и компрессов.
3. Хирургическая обработка рук хирургов.

Противопоказания

1. Повышенная чувствительность.
2. Нельзя применять при острых воспалительных процессах кожи.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При наружном применении этанола результаты взаимодействия с другими лекарственными средствами неизвестны.

Особенности применения

В случае покраснения и раздражения кожи необходимо прекратить применение препарата и смыть жидкость водой.

Не допускать попадания препарата в глаза!

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

В период беременности и кормления грудью применение препарата возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Наружно — для обтираний, компрессов, дезинфекции кожи, в том числе рук.

Для компрессов, обтираний (с целью предотвращения ожога, этанол следует развести водой в соотношении 1:1).

Дети

Применяют по назначению врача.

Передозировка

При наружном применении случаи передозировки неизвестны.

Побочные реакции

При местном применении возможно раздражение кожи или слизистых оболочек. В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.

Срок годности

5 лет.

Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в хорошо укупоренной таре в недоступном для детей мест

Упаковка

По 100 мл во флаконах.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ООО «ГКП» Фармацевтическая фабрика ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул. Королева, д. 4.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).