

Состав

действующее вещество: цинка оксид;

1 г присыпки содержит цинка оксида 0,1 г;

вспомогательные вещества: тальк, крахмал картофельный.

Лекарственная форма

Порошок.

Основные физико-химические свойства: белого или почти белого цвета, мягкий, жирный на ощупь порошок.

Фармакотерапевтическая группа

Дерматологические средства. Препараты со смягчающим и защитным действием. Препараты цинка.

Код АТХ D02A B.

Фармакодинамика

Адсорбирующее, подсушивающее, антисептическое, противовоспалительное средство для наружного применения. Обладает высокой гигроскопичностью, адсорбирует выделения потовых и сальных желез, экссудат, уменьшает трение кожных складок, защищает кожу от неблагоприятного внешнего воздействия.

Цинка оксид вызывает денатурацию белков и образования альбуминатов, которые подавляют процесс местного воспаления с ослаблением болевых ощущений, сужают кровеносные сосуды, уплотняют клеточные мембраны.

Препарат уменьшает выраженность местных явлений воспаления и раздражения.

Фармакокинетика

Компоненты препарата не проникают сквозь кожу и не оказывают системного действия.

Показания

Опрелости.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата. Острые гнойно-воспалительные заболевания кожи, мокнущие участки пораженной кожи.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Информация отсутствует.

Особенности применения

Препарат не применять при инфицированных повреждениях и гнойничковых заболеваниях кожи. Не следует наносить препарат на влажную кожу.

Улучшение состояния наступает после двукратного или трехкратного применения препарата. Не следует допускать попадания препарата в глаза, дыхательные пути и на открытую поверхность раны.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат можно применять в период беременности или кормления грудью.

Способ применения и дозы

Препарат применять наружно. Присыпку наносить на сухой участок опрелостей после купания и при смене пеленок.

Срок лечения зависит от течения заболевания, его определяет врач индивидуально.

Дети

Применять детям.

Передозировка

Не отмечалась.

Побочные реакции

При повышенной чувствительности к препарату возможны аллергические реакции (зуд, гиперемия, высыпания).

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 г в контейнере полимерном.

По 50 г в банке, по 1 банке в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

АО «ВИТАМИНЫ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 20300, Черкасская обл., г. Умань, ул. Успенская, 31.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).