

Состав

действующие вещества: 10 мл сиропа содержат экстракт адхатоды сосудистой листьев густого (*Adhatoda vasica*) (5: 1), (экстрагент вода очищенная) - 120 мг экстракта солодки голой корней густого (*Glycyrrhiza glabra*) (4,17: 1), (экстрагент вода очищенная) - 18 мг экстракта перца длинного плодов густого (*Piper longum*) (4: 1), (экстрагент вода очищенная) - 25 мг экстракта фиалки душистой цветков густого (*Viola odorata*) (4,17: 1), (экстрагент вода очищенная) - 6 мг экстракта иссопа лекарственного листьев густого (*Hyssopus officinalis*) (4,17: 1), (экстрагент вода) - 12 мг экстракта калгана большого корней густого (*Alpinia galanga*) (4,17: 1), (экстрагент вода очищенная) - 12 мг экстракта экстракта кордия широколистой плодов густого (*Cordia latifolia*) (4: 1), (экстрагент вода очищенная) - 25 мг экстракта алтея лекарственного семян густого (*Althaea officinalis*) (4: 1), (экстрагент вода очищенная) - 25 мг экстракта зизифуса обычного плодов густого (*Zyzyphus vulgaris*) (4: 1), (экстрагент вода очищенная) - 25 мг экстракта оносмы прицветные листья густого (*Onosma bracteatum*) (4: 1), (экстрагент вода очищенная) - 25 мг

вспомогательные вещества: пропиленгликоль, сахарин натрия, сорбита раствор (Е 420), глицерин, лимонная кислота, метилпарабен (Е 218), пропилпарабен (Е 216), масло мяты перечной, масло гвоздики, вода очищенная.

Лекарственная форма

Сироп.

Основные физико-химические свойства: сироп коричневого цвета со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Комбинированные препараты, применяемые при простудных заболеваниях.

Код АТХ R05X.

Фармакодинамика

Комплексный препарат на основе лекарственных трав с противовоспалительными, отхаркивающими, муколитическими, спазмолитическим и жаропонижающими свойствами. Активирует секреторную функцию эпителия дыхательных путей, изменяет поверхностно активные свойства легочного сурфактанта, стимулирует функцию ворсинок эпителия, что

положительно влияет на экссудативную и полиферативну фазы воспаления. Разжижает густую мокроту и облегчает отхождение слизи дыхательных путей. На слизистые оболочки глотки и бронхов действует как местный антисептик.

Прием препарата снижает тонус гладких мышц бронхиол и трахеи, увеличивает размер бронхиол и альвеолярных мешочков, уменьшает отеки слизистых оболочек. Изменения выраженности кашля отмечается через 3-4 дня приема препарата.

Показания

Комплексная терапия воспалительных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, сопровождающихся сухим раздражающим кашлем; бронхит (острый и хронический); фарингит, трахеит, трахеобронхит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Органические поражения сердца (миокардит, перикардит, инфаркт миокарда), артериальная гипертензия, нарушение функции печени и почек; гипокалиемия тяжелый степень ожирения.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не рекомендуется одновременный прием препарата с противокашлевыми средствами, уменьшающими отхождения мокроты (например, кодеин).

При необходимости одновременного применения любых других лекарственных средств следует сообщить врачу.

Особенности применения

Сироп не содержит сахара, поэтому его можно применять больным сахарным диабетом и пациентам, находящимся на гипокалорийной диете. В состав препарата входит раствор сорбита, применение которого может оказать мягкое послабляющее действие. Энергетическая ценность 1 г сорбита - 2,6 ккал. Применение пропиленгликоля 400 мг/кг (для взрослых), 200 мг/кг (для детей) может вызвать симптомы, сходные с возникающими при употреблении алкоголя.

Экспериментальные и клинические исследования свидетельствуют о безвредности применения препарата Линкас без сахара пациентам пожилого возраста.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет на способность управлять автомобилем или работать с механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применять в период беременности и кормления грудью противопоказано, поскольку солодки голой корни входящих в состав лекарственного средства, повышают уровень эстрогенов, вследствие чего нарушается гормональный баланс. В случае необходимости приема препарата в период кормления грудью, кормление грудью следует прекратить.

Способ применения и дозы

Применять внутрь. Взрослым и детям старше 12 лет принимать по 2 чайные ложки (10 мл) сиропа 3-4 раза в сутки;

детям в возрасте от 7 до 11 лет - по 1 чайной ложке (5 мл) сиропа 4 раза в сутки;

детям в возрасте от 3 до 6 лет - по 1 чайной ложке (5 мл) сиропа 3 раза в сутки;

детям в возрасте от 1 до 2 лет - по ½ чайной ложке (2,5 мл) 3-4 раза в сутки.

Продолжительность лечения - 3 до 7 дней.

Дети

Детям в возрасте до 1 года препарат не назначать.

Передозировка

Передозировка и длительное применение (более 2 месяцев) может привести к нарушению водно-электролитного баланса, в результате чего возможно развитие гипокалиемической миопатии и миоглобинурии. Возможно усиление побочных эффектов.

Побочные реакции

При применении препарата возможны слабость, повышение артериального давления, гипокалиемия, аллергические реакции (в том числе сыпь, гиперемия кожи, анулярный эритема, зуд, крапивница, ангионевротический отек) усиленное слюноотделение, раздражение слизистой оболочки желудка.

При возникновении каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

Сироп по 120 мл во флаконе № 1, в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Хербион Пакистан Прайвет Лимитед.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Участок №30 сектор 28 Промышленная зона Коранги, Карачи, Пакистан.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).