

Состав

активные компоненты:

- экстракт листьев ореха грецкого содержит уникальное вещество юглон, которая является естественным фитобиотиком и препятствует развитию большого спектра патогенной микрофлоры. Также экстракт грецкого ореха оказывает рассасывающее действие, способствуя восстановлению функционирования женской половой системы после распространенных воспалительных процессов и агрессивных методов лечения;
- экстракт цветков календулы лекарственной демонстрирует противовоспалительные свойства, способствует скорейшей регенерации поврежденных тканей и ускоряет процессы восстановления вагинальной слизистой оболочки. Также экстракт календулы обладает иммуномодулирующим эффектом, препятствуя развитию патогенных грибов;
- экстракт листьев облепихи крушиновидной обеспечивает интенсивную эпителизацию слизистой оболочки, позволяет широко использовать его в качестве вспомогательного средства при комплексном лечении эрозии шейки матки;
- экстракт цветков фиалки трехцветной уменьшает дискомфортные проявления воспалительных процессов органов малого таза благодаря своим противозудным свойствам. Также
- экстракт фиалки способствует нормализации баланса женской гормональной системы и обеспечивает физиологический ритм ее функций.

Свойства

Суппозитории «Фемирил» обладают следующими свойствами:

- благодаря локальной действия активных компонентов способствуют быстрой ликвидации воспалительного процесса в органах малого таза
- препятствуют присоединению бактериальной флоры на высоте воспалительного процесса
- поддерживают интенсивную регенерацию слизистой оболочки, уменьшая сухость и дискомфорт, в т.ч. в климактерический период
- способствуют гормональному балансу женского организма и повышают либидо

Показания

Фемирил суппозитории может быть рекомендован врачом с целью улучшения функционального состояния женской половой системы, предоставление местного противовоспалительного эффекта в половых органах и нормализации гормонального баланса женщины.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, возраст, период беременности и лактации.

Способ применения и дозы

Применяется вагинально или ректально в положении лежа, по 1 суп. 2-3 раза в день (или индивидуальный курс по назначению врача). Перед применением суппозиторий предварительно надо смочить кипяченой водой, после введения желательно полежать 20-30 мин.

Курс применения от 10 дней до 1-го месяца, в зависимости от тяжести состояния и индивидуальных особенностей.

Упаковка

10 супозиторіїв в упаковці.

Производитель

ООО "Бовиос Фарм", Украина