

Состав

действующее вещество: хлоргексидин;

1 pessaries contains chlorhexidine biglyconate, 20 % solution, which corresponds to chlorhexidine 16 mg;

вспомогательное вещество: полиэтиленоксид.

Лекарственная форма

Пессарии.

Основные физико-химические свойства: pessaries from white to white with a yellowish tint of color, marbling of the surface is allowed. The presence of a funnel-shaped indentation and an air stержень is allowed.

Фармакотерапевтическая группа

Противомикробные и антисептические средства, применяемые в гинекологии.
Код АТХ G01A X.

Фармакодинамика

Chlorhexidine biglyconate exerts a rapid and pronounced effect on Gram-positive and Gram-negative bacteria, yeasts and dermatophytes: *Treponema pallidum*, *Chlamidia spp.*, *Ureaplasma spp.*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*. Some strains of *Pseudomonas spp.*, *Proteus spp.* are weakly sensitive to the preparation. Acid-resistant forms of bacteria, bacterial spores, fungi, viruses are insensitive to the preparation.

Фармакокинетика

При интравагинальном применении практически не всасывается, системного действия не оказывает.

Показания

- Профилактика венерических заболеваний (сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, уреаплазмоз) и инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве и гинекологии (перед оперативным лечением гинекологических заболеваний, перед родами и абортом, до и после установки внутриматочной спирали, до и после диатермокоагуляции шейки матки, перед внутриматочными исследованиями).
- Лечение бактериального вагиноза, кольпита, эрозии шейки матки.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Хлоргексидина биглюконат нельзя применять вместе с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза), а также с мылом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Не противопоказано.

Способ применения и дозы

Препарат применять интравагинально. Перед применением pessaries освободить от контурной упаковки.

Лечение: применять по 1 pessarium 2 раза в сутки в течение 7-10 дней в зависимости от характера заболевания. При необходимости возможно продление курса лечения до 20 дней.

Профилактика венерических заболеваний: применять однократно по 1 pessarium не позднее чем через 2 часа после полового акта.

Беременность. Учитывая степень выраженности инфекционного процесса, данные бактериологических исследований, наличие угрозы прерывания беременности, хлоргексидина биглюконат применять по 1 pessary 1 или 2 раза в сутки в качестве монотерапии или в составе комплексной терапии. Длительность применения – от 5 до 10 дней.

При кормлении грудью препарат применять в обычных рекомендованных дозах.

Дети

Опыт применения отсутствует.

Передозировка

Передозировка и токсические эффекты при применении препарата не выявлены.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции, зуд в месте введения суппозитория.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 5 pessaries в стрипе, по 2 стрипа в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «ФАРМЕКС ГРУП».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 08301, Киевская обл., г. Борисполь, ул. Шевченка, д. 100.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).