

Состав

действующее вещество: chloramphenicol;

1 суппозиторий содержит синтомицина 250 мг (0,25 г);

вспомогательные вещества: твердый жир.

Лекарственная форма

Суппозитории вагинальные.

Основные физико-химические свойства: суппозитории белого или белого с желтоватым или кремовым оттенком цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Противомикробные и антисептические средства, применяемые в гинекологии. Антибиотики. Код АТХ G01A A05.

Фармакодинамика

Действующим веществом препарата является хлорамфеникол - антибиотик широкого спектра действия, который обладает высокой антибактериальной активностью в отношении возбудителей различных форм гнойно-воспалительных процессов. Хлорамфеникол - бактериостатический антибиотик, он нарушает процесс синтеза белка в микробной клетке (имея хорошую липофильностью, проникает через клеточную мембрану бактерий и обратимо связывается с субъединицей 50S бактериальных рибосом, в результате задерживается перемещение аминокислот к пептидных цепей, которые растут, что приводит к нарушению синтеза белка).

Активен в отношении большинства штаммов грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, возбудителей гнойных, кишечных инфекций, менингококковой инфекции: *Escherichia coli*, *Shigella dysenteria*, *Shigella flexneri*, *Shigella boydii* spp., *Shigella sonnei*, *Salmonella* spp. (В том числе

Salmonella typhi, *Salmonella paratyphi*), *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, (в том числе *Streptococcus pneumoniae*), *Neisseria meningitidis*, *Neisseria gonorrhoeae* некоторых штаммов *Proteus spp.*, *Burkholderia pseudomallei*, *Rickettsia spp.*, *Treponema spp.*, *Leptospira spp.*, *Chlamydia spp.*, (в том числе *Chlamydia trachomatis*), *Coxiella burnetii*, *Ehrlichia canis*, *Bacteroides fragilis*, *Klebsiella pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*. Не действует на кислотоустойчивые бактерии (в том числе *Mycobacterium tuberculosis*), анаэробы, устойчивые к метициллину штаммы стафилококков, *Acinetobacter*, *Enterobacter*, *Serratia marcescens*, индолположительные штаммы *Proteus spp.*, *Pseudomonas aeruginosa spp.*, Простейшие грибы.

Устойчивость микроорганизмов к хлорамфениколу развивается медленно.

Фармакокинетика

Действует местно, хорошо проникает в ткани матки. Период полувыведения составляет 3-5 часов. Выводится с мочой в неизмененном виде и в виде метаболитов, частично выводится с калом.

Показания

- Бактериальные гинекологические инфекции (вагинит, цервицит), вызванные чувствительными к синтомицину микроорганизмами.
- Для профилактики гнойно-воспалительных заболеваний в гинекологии; перед инвазивными процедурами: абортами, гинекологическими операциями (диатермокоагуляция шейки матки, гистерография), до и после установки внутриматочной спирали.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
- Аллергия и токсическая реакция (диспепсические явления, дисбактериоз, психические расстройства) на хлорамфеникол в анамнезе.
- Псориаз.
- Экзема.
- Грибковые заболевания влагалища.
- Подавление костномозгового кроветворения.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Одновременное применение препарата с эритромицином, олеандомицином, нистатином и леворином - повышает антибактериальную активность, а с солями бензилпенициллина - понижает. Препарат несовместим с дифенилы, барбитуратами и этанолом. Не следует назначать одновременно с препаратами, угнетающими кроветворение (сульфаниламиды, производные пиразолона, цитостатики).

Особенности применения

При длительном применении развивается кандидоз половых органов. В процессе лечения необходим систематический контроль состава периферической крови при появлении лейкопении препарат необходимо отменить.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Испытания по изучению влияния суппозиторий на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами проведены не были.

Применение в период беременности или кормления грудью

Не применять в период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Применять взрослым женщинам.

Предварительно освободив суппозиторий от контурной оболочки, вводить его как можно глубже во влагалище. Больная должна при этом лежать на спине.

Применять по 1 суппозиторию 2-3 раза в сутки.

Максимальная суточная доза - 4 суппозитории. Курс лечения - 5-7 дней.

Дети

Препарат не применять детям.

Передозировка

Симптомы: возможно усиление побочных эффектов препарата.

Лечение: симптоматическое.

Побочные реакции

Со стороны системы кроветворения: лейкопения, тромбоцитопения, ретикулоцитопения, снижение уровня гемоглобина в крови.

Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая: отек Квинке, другие признаки раздражения, не отмечались к лечению, кожная сыпь, зуд, жжение, гиперемия, отек.

Со стороны желудочно-кишечного тракта: диспепсические явления (тошнота, рвота, жидкий стул).

В этих случаях применение препарата следует прекратить.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 5 суппозиторий в стрипах. По 2 стрипа в пачке из картона.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ЧАО «Монфарм».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 19100, Черкасская обл., Г. Монастырище, ул. Заводская, 8.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).