

Состав

действующее вещество: Calendula officinalis;

1 суппозиторий содержит Calendula officinalis Ø 150 мг;

вспомогательные вещества: макрогол 400, макрогол 1500, макрогол 4000.

Лекарственная форма

Суппозитории вагинальные.

Основные физико-химические свойства: суппозитории цилиндрической-конической формы белого цвета с желтоватым оттенком. На срезе допускается наличие воздушного и пористого стержня и воронкообразной углубление.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые в гинекологии. Код АТХ G02C C.

Фармакодинамика

Calendula officinalis (календула лекарственная) содержит флавоноиды, сапонины, каротиноиды, тритерпеновые спирты. Их фармакологическое действие взаимно дополняется и обеспечивает противовоспалительный эффект, ускоряет процесс грануляции и эпителизации, действует фунгистатично и цитотоксическое, а также оказывает защитное, антибиотические и иммуностимулирующее действие.

Показания

Воспалительные заболевания влагалища, которые сопровождаются выделениями, зудом, жжением, покраснением.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Повышенная чувствительность к растениям семейства Asteraceae (сложноцветных), таких как ромашка, эхинацея, арника (возможна перекрестная реакция).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не изучали.

В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Нет достаточных данных относительно применения лекарственного средства в период беременности или кормления грудью.

Способ применения и дозы

Суппозитории применяют интравагинально 2-3 раза в сутки. Перед применением суппозиториев следует увлажнить прокипяченной охлажденной водой.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально. Если в течение 3-4 дней от начала лечения симптомы не исчезают или отмечается ухудшение состояния, необходимо проконсультироваться с врачом.

Дети

Не применяют.

Передозировка

Сообщения отсутствуют.

Побочные реакции

Лекарственное средство, как правило, переносится хорошо, однако при индивидуальной повышенной чувствительности возможно развитие аллергических реакций.

При применении препарата возможны раздражение слизистой оболочки влагалища и половых губ.

В случае возникновения каких-либо побочных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 5 суппозиторияев в стрипе, по 2 стрипа в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ФАРМИНА Лтд.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Ул. Липски, 44, 30-721 Краков, Польша.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).