

Состав

действующее вещество: бензалкония хлорид;

1 суппозиторий содержит 18,9 мг бензалкония хлорида;

вспомогательные вещества: масло лимонное, липофильное основа.

Лекарственная форма

Суппозитории вагинальные.

Основные физико-химические свойства: белого со слегка желтоватым оттенком цвета, пулевидной формы, с запахом лимона.

Фармакотерапевтическая группа

Контрацептивное средство для местного применения.

Код АТХ G02B B.

Фармакодинамика

Бензалкония хлорид - поверхностно-активное катионное вещество, противозачаточные свойства которой связаны со способностью разрушать мембраны сперматозоидов. После контакта бензалкония хлорида со сперматозоидами происходит их немедленная иммобилизация, а дальше - разрушение их клеточной мембраны и отделения жгутиков от головок. Противозачаточное действие лекарственного средства Эроте́кс также реализуется за счет сгущения цервикальной слизи и образования пленки, благодаря чему уменьшается способность сперматозоидов проникать сквозь внешний зев шейки матки.

Контрацептивный эффект измеряется индексом Перла, для бензалкония хлорида в форме суппозитория он составляет менее 1, то есть при условии правильного применения и соблюдения всех требований частота нежелательной беременности составляет примерно 1% в год.

Препарат не влияет на либидо и фертильность, имеет обратимый эффект при его отмене.

Эроте́кс имеет также антисептическое и противомикробное действие и снижает риск заражения инфекциями, передающимися половым путем, однако не

исключает его полностью.

Фармакокинетика

Препарат не поглощается слизистой оболочкой влагалища, а только абсорбируется на ее стенках, легко удаляется спринцеванием чистой водой или удаляется с физиологическими влагалищными выделениями, действует только местно и не попадает в системный кровоток. Продолжительность местного действия Эротекса составляет 4 часа.

Показания

Местная контрацепция для всех женщин репродуктивного возраста.

Препарат используется как самостоятельно, так и в комбинации с другими методами, усиливает их контрацептивное действие. Применение Эротекса особенно целесообразно в случаях, когда преимущества местной контрацепции неопровержимы:

- При наличии постоянных или временных противопоказаний к пероральной контрацепции или внутриматочной спирали (после родов, в период кормления грудью, после прерывания беременности, в период менопаузы);
- При необходимости эпизодического предохранения (нерегулярная половая жизнь);
- При применении пероральной контрацепции, если женщина забыла или опоздала принять таблетку (в этом случае нужно дополнительно использовать Эротекс в любые дни цикла);
- Как вспомогательное средство при барьерной контрацепции (влагалищная диафрагма) или наличии внутриматочной спирали, особенно при одновременном применении некоторых лекарственных средств (например, нестероидных противовоспалительных средств).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, вагинит, язвы и раздражение слизистой оболочки влагалища и шейки матки.

Невозможность использования вагинальных суппозиторий лицами с нарушениями психики и лицами, которые не допускают каких-либо вмешательств на половых органах или не способны понять и согласиться с этим типом контрацепции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При применении Эротека не рекомендуется использовать другие вагинальные формы лекарственных средств, чтобы избежать их взаимодействия и уменьшения контрацептивного эффекта.

Мыло и другие средства гигиены на основе мыла инактивируют хлорид бензалкония, что приводит к потере его контрацептивного действия.

Лекарственное средство химически несовместимо с препаратами йода.

Особенности применения

Противозачаточная эффективность препарата Эртекс в значительной степени зависит от тщательного соблюдения правил применения препарата!

Для достижения максимального эффекта следует запомнить эти правила и следовать им:

- *Препарат необходимо применять перед каждым половым контактом независимо от фазы менструального цикла (использование препарата только в «опасные дни» снижает эффективность метода)*
- *В случае повторных половых контактов необходимо вводить другой суппозиторий Эртекс (один суппозиторий на один половой контакт!)*
- *Для гигиены половых органов запрещается использовать мыло или другие средства на основе мыла в течение 2 часов до и 2 часов после половой близости, потому что даже незначительные их остатки разрушают действующее вещество Эротека. Следует использовать только чистую воду!*
- *Не спринцевать влагалище в течение 2 часов после полового акта.*
- *Нельзя использовать Эртекс без разрешения врача, если обнаружены какие-либо заболевания влагалища.*

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность: Препарат является контрацептивом, во время беременности не используется. При наступлении беременности на фоне контрацепции

бензалкония хлоридом, воздействие на течение беременности не обнаружено.

Период лактации: Не выделяется с грудным молоком, может применяться в период лактации.

Способ применения и дозы

1. Извлечь суппозиторий с защитной упаковки.
2. В лежащем положении ввести его как можно глубже во влагалище не менее за 5 минут до полового акта. За это время активное спермицидное вещество равномерно распределяется во влагалище.
3. В случае повторного полового контакта необходимо ввести другой суппозиторий Эротекс (один суппозиторий на один половой контакт).

При применении препарата Эротекс необходимо учитывать, что суппозитории имеют умеренный увлажняющий эффект.

Дети

Эротекс не следует применять детям.

Передозировка

Случаев передозировки препарата не зарегистрировано.

Побочные реакции

У пациентов с повышенной чувствительностью к бензалконию хлориду могут возникать аллергические реакции. В редких случаях возможно раздражение, покалывание, ощущение тепла в месте введения, контактный дерматит, зуд, жжение во влагалище или половом члене партнера, болезненность при мочеиспускании.

В случае возникновения нежелательных побочных эффектов следует прекратить использование препарата. Системных побочных эффектов не зарегистрировано.

Срок годности

2 года.

Не следует применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре от 2 °С до 15 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 5 суппозиториев в стрипе из пленки поливинилхлоридной, по 2 стрипа в пачке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Совместное украинский-испанское предприятие «Сперко Украина».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

21027, Украина, г.. Винница, ул. 600-летия, 25.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).